

【参考】相馬市職員における新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応について(R3.6.14現在)

①1回目接種後の副反応(複数回答)

主な副反応の区分	男性							女性							全体の発症件数	全体の発症割合
	20代	30代	40代	50代	60代	計	発症割合	20代	30代	40代	50代	60代	計	発症割合		
	30名	66名	48名	41名	6名	191名		12名	20名	33名	8名	0名	73名			
接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	28	61	42	31	4	166	86.9%	11	17	29	8	0	65	89.0%	231	87.5%
発熱(37.5℃以上)	2	1	0	0	0	3	1.6%	2	2	0	0	0	4	5.5%	7	2.7%
発熱(37.5℃未満)	0	3	1	2	1	7	3.7%	1	2	4	0	0	7	9.6%	14	5.3%
倦怠感	5	7	4	4	1	21	11.0%	3	6	5	0	0	14	19.2%	35	13.3%
関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	3	5	2	4	2	16	8.4%	2	5	3	1	0	11	15.1%	27	10.2%
めまい	1	2	0	1	0	4	2.1%	0	1	1	0	0	2	2.7%	6	2.3%
頭痛	1	4	1	1	2	9	4.7%	3	5	3	0	0	11	15.1%	20	7.6%
吐き気	1	0	0	0	0	1	0.5%	0	0	1	0	0	1	1.4%	2	0.8%
その他(悪寒、手のしびれ)	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	1	1	0	0	3	4.1%	3	1.1%
特に何もなかった	0	2	2	7	1	12	6.3%	1	0	1	0	0	2	2.7%	14	5.3%
計	41	85	52	50	11	239		24	39	48	9	0	120		359	

【1回目接種済み】 264名名(接種率 98.9%)

②2回目接種後の副反応(複数回答)

主な副反応の区分	男性							女性							全体の発症件数	全体の発症割合
	20代	30代	40代	50代	60代	計	発症割合	20代	30代	40代	50代	60代	計	発症割合		
	22名	53名	39名	28名	2名	144名		8名	16名	22名	4名	0名	50名			
接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	20	52	35	25	1	133	92.4%	7	15	20	3	0	45	90.0%	178	91.8%
発熱(37.5℃以上)	15	26	11	7	0	59	41.0%	4	11	13	2	0	30	60.0%	89	45.9%
発熱(37.5℃未満)	2	12	9	8	0	31	21.5%	0	2	4	0	0	6	12.0%	37	19.1%
倦怠感	17	37	18	16	1	89	61.8%	7	11	16	2	0	36	72.0%	125	64.4%
関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	12	23	9	8	1	53	36.8%	6	9	9	4	0	28	56.0%	81	41.8%
めまい	4	4	3	2	0	13	9.0%	0	1	4	0	0	5	10.0%	18	9.3%
頭痛	13	21	11	6	0	51	35.4%	5	7	15	1	0	28	56.0%	79	40.7%
吐き気	0	4	1	1	0	6	4.2%	1	0	1	0	0	2	4.0%	8	4.1%
その他(悪寒、眠気、咳、腰痛)	0	4	2	0	0	6	4.2%	1	0	0	0	0	1	2.0%	7	3.6%
特に何もなかった	0	0	0	1	1	2	1.4%	0	0	0	0	0	0	0.0%	2	1.0%
計	83	183	99	74	4	443		31	56	82	12	0	181		624	

【2回目接種済み】 194名名(接種率 72.7%)