


【相馬市職員】新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応にかかる詳細調査結果

1. 副反応ごとの発症割合グラフ(下表の年代別男女計の発症割合)



◎接種後における副反応別のアンケート結果(複数回答)


※アンケート回答者数:265名/270名(回答率:98.1%)

主な副反応の区分	男性(年代別回答者数)						女性(年代別回答者数)						全体の発症割合/数	
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(29名)						(13名)						(265名)	
	(63名)						(21名)						(254名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(46名)						(33名)						(265名)	
	(37名)						(8名)						(254名)	
(1)接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	1回目接種後	86%	90%	94%	83%	100%	89%	92%	90%	91%	100%	-	92%	90.2%
	2回目接種後	72%	83%	93%	62%	100%	80%	92%	90%	79%	63%	-	82%	80.7%
(2)発熱(37.5℃以上)	1回目接種後	3%	2%	2%	2%	0%	2%	8%	5%	0%	0%	-	3%	2.3%
	2回目接種後	66%	41%	33%	22%	17%	38%	75%	65%	52%	38%	-	58%	43.7%
(3)発熱(37.5℃未満)	1回目接種後	0%	6%	0%	2%	14%	3%	23%	10%	9%	0%	-	11%	5.3%
	2回目接種後	10%	24%	22%	32%	33%	23%	8%	10%	21%	25%	-	16%	21.3%
(4)倦怠感(だるさ、疲れなど)	1回目接種後	28%	17%	10%	14%	14%	16%	31%	33%	12%	0%	-	20%	17.4%
	2回目接種後	79%	57%	52%	57%	17%	58%	75%	60%	73%	63%	-	68%	61.0%
(5)関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	1回目接種後	17%	10%	4%	7%	14%	9%	15%	19%	3%	13%	-	11%	9.4%
	2回目接種後	55%	33%	20%	35%	33%	34%	58%	45%	30%	38%	-	40%	35.4%
(6)めまい	1回目接種後	0%	2%	0%	0%	0%	1%	0%	5%	6%	0%	-	4%	1.5%
	2回目接種後	17%	5%	7%	5%	0%	7%	17%	0%	15%	0%	-	10%	7.9%
(7)頭痛	1回目接種後	3%	5%	6%	5%	29%	6%	23%	29%	9%	0%	-	16%	8.7%
	2回目接種後	48%	29%	30%	19%	0%	29%	58%	25%	55%	25%	-	44%	33.5%
(8)その他(悪寒、手のしびれ、吐き気、下痢、腰痛、腹痛など)	1回目接種後	3%	0%	0%	0%	0%	1%	8%	5%	9%	0%	-	7%	2.3%
	2回目接種後	0%	5%	0%	3%	0%	2%	33%	5%	12%	0%	-	12%	5.1%
(9)特に何もなかった	1回目接種後	7%	2%	6%	12%	0%	6%	8%	0%	9%	0%	-	5%	5.7%
	2回目接種後	0%	2%	0%	8%	0%	2%	0%	0%	6%	13%	-	4%	2.8%

【1回目接種率】100%(270名/270名)、【2回目接種率】95.9%(259名/270名)

2. 接種後の副反応ごとの状況について

(1) 接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(25名)	(57名)	(46名)	(35名)	(7名)	(170名)	(12名)	(19名)	(30名)	(8名)	(0名)	(69名)	(239名)
2回目接種後の年代別回答者数		(21名)	(52名)	(43名)	(23名)	(6名)	(145名)	(11名)	(18名)	(26名)	(5名)	(0名)	(60名)	(205名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	8.3%	-	-	-	-	1.4%	0.4%
	2回目接種後	-	1.9%	-	-	-	0.7%	-	5.6%	-	-	-	1.7%	1.0%
接種日から翌日まで	1回目接種後	36.0%	31.6%	34.8%	31.4%	-	31.8%	25.0%	21.1%	36.7%	25.0%	-	29.0%	31.0%
	2回目接種後	33.3%	28.8%	34.9%	39.1%	16.7%	32.4%	63.6%	27.8%	26.9%	60.0%	-	36.7%	33.7%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	36.0%	47.4%	45.7%	34.3%	57.1%	42.9%	50.0%	63.2%	43.3%	25.0%	-	47.8%	44.4%
	2回目接種後	33.3%	42.3%	41.9%	30.4%	66.7%	40.0%	27.3%	55.6%	46.2%	20.0%	-	43.3%	41.0%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	4.0%	7.0%	10.9%	22.9%	14.3%	11.2%	-	5.3%	6.7%	12.5%	-	5.8%	9.6%
	2回目接種後	9.5%	11.5%	16.3%	17.4%	-	13.1%	-	-	3.8%	-	-	1.7%	9.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	20.0%	12.3%	8.7%	11.4%	28.6%	12.9%	16.7%	10.5%	3.3%	37.5%	-	11.6%	12.6%
	2回目接種後	23.8%	13.5%	7.0%	13.0%	16.7%	13.1%	9.1%	11.1%	19.2%	20.0%	-	15.0%	13.7%
その他	1回目接種後	4.0%	1.8%	-	-	-	1.2%	-	-	10.0%	-	-	4.3%	2.1%
	2回目接種後	-	1.9%	-	-	-	0.7%	-	-	3.8%	-	-	1.7%	1.0%


②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	4.0%	8.8%	10.9%	8.6%	14.3%	8.8%	33.3%	5.3%	16.7%	-	-	14.5%	10.5%
	2回目接種後	4.8%	9.6%	4.7%	4.3%	-	6.2%	9.1%	11.1%	-	40.0%	-	8.3%	6.8%
接種日の翌日	1回目接種後	92.0%	91.2%	87.0%	91.4%	85.7%	90.0%	66.7%	94.7%	83.3%	100.0%	-	85.5%	88.7%
	2回目接種後	85.7%	88.5%	88.4%	91.3%	83.3%	88.3%	81.8%	83.3%	100.0%	60.0%	-	88.3%	88.3%
接種日の翌々日	1回目接種後	4.0%	-	2.2%	-	-	1.2%	-	-	-	-	-	-	0.8%
	2回目接種後	9.5%	-	7.0%	4.3%	16.7%	4.8%	9.1%	5.6%	-	-	-	3.3%	4.4%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	1.9%	-	-	-	0.7%	-	-	-	-	-	-	0.5%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	1.9%	2.3%	-	-	1.4%	-	-	-	-	-	-	1.0%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	98.1%	97.7%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	99.0%

④薬は服用したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	4.0%	1.8%	-	-	14.3%	1.8%	-	-	6.7%	-	-	2.9%	2.1%
	2回目接種後	9.5%	1.9%	9.3%	8.7%	33.3%	7.6%	-	5.6%	7.7%	-	-	5.0%	6.8%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	3.5%	-	-	-	1.2%	-	5.3%	-	-	-	1.4%	1.3%
	2回目接種後	-	5.8%	2.3%	-	-	2.8%	-	5.6%	3.8%	-	-	3.3%	2.9%
薬は服用しなかった	1回目接種後	96.0%	94.7%	100.0%	100.0%	85.7%	97.1%	100.0%	94.7%	93.3%	100.0%	-	95.7%	96.7%
	2回目接種後	90.5%	92.3%	88.4%	91.3%	66.7%	89.7%	100.0%	88.9%	88.5%	100.0%	-	91.7%	90.2%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	92.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	98.2%	91.7%	94.7%	93.3%	100.0%	-	94.2%	97.1%
	2回目接種後	90.5%	88.5%	90.7%	95.7%	83.3%	90.3%	90.9%	83.3%	84.6%	100.0%	-	86.7%	89.3%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	8.0%	-	-	-	14.3%	1.8%	8.3%	5.3%	6.7%	-	-	5.8%	2.9%
	2回目接種後	9.5%	9.6%	9.3%	4.3%	16.7%	9.0%	9.1%	16.7%	15.4%	-	-	13.3%	10.2%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	1.9%	-	-	-	0.7%	-	-	-	-	-	-	0.5%

(2) 発熱(37.5℃以上)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃以上)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(1名)	(1名)	(1名)	(1名)	(0名)	(4名)	(1名)	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(2名)	(6名)
2回目接種後の年代別回答者数		(19名)	(26名)	(15名)	(8名)	(1名)	(69名)	(9名)	(13名)	(17名)	(3名)	(0名)	(42名)	(111名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	50.0%	16.7%
	2回目接種後	21.1%	19.2%	46.7%	37.5%	-	27.5%	33.3%	38.5%	5.9%	-	-	21.4%	25.2%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	7.7%	6.7%	12.5%	-	5.8%	-	15.4%	11.8%	-	-	9.5%	7.2%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	75.0%	-	-	-	-	-	-	50.0%
	2回目接種後	63.2%	57.7%	40.0%	25.0%	100.0%	52.2%	44.4%	46.2%	70.6%	66.7%	-	57.1%	54.1%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	50.0%	16.7%
	2回目接種後	15.8%	15.4%	6.7%	25.0%	-	14.5%	22.2%	-	11.8%	33.3%	-	11.9%	13.5%
その他	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	75.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	100.0%	83.3%
	2回目接種後	89.5%	100.0%	86.7%	100.0%	100.0%	94.2%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	-	97.6%	95.5%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	16.7%
	2回目接種後	10.5%	-	13.3%	-	-	5.8%	-	-	-	33.3%	-	2.4%	4.5%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	16.7%
	2回目接種後	-	3.8%	-	-	-	1.4%	-	-	-	-	-	-	0.9%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	75.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	100.0%	83.3%
	2回目接種後	100.0%	96.2%	100.0%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	99.1%

④薬は服用したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	100.0%	100.0%	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	33.3%
	2回目接種後	36.8%	61.5%	60.0%	62.5%	100.0%	55.1%	22.2%	30.8%	64.7%	33.3%	-	42.9%	50.5%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	50.0%	16.7%
	2回目接種後	10.5%	7.7%	13.3%	-	-	8.7%	22.2%	23.1%	11.8%	33.3%	-	19.0%	12.6%
薬は服用しなかった	1回目接種後	100.0%	-	-	100.0%	-	50.0%	100.0%	-	-	-	-	50.0%	50.0%
	2回目接種後	52.6%	30.8%	26.7%	37.5%	-	36.2%	55.6%	46.2%	23.5%	33.3%	-	38.1%	36.9%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	-	-	100.0%	-	-	25.0%	100.0%	-	-	-	-	50.0%	33.3%
	2回目接種後	15.8%	15.4%	26.7%	25.0%	-	18.8%	22.2%	15.4%	11.8%	33.3%	-	16.7%	18.0%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	100.0%	100.0%	-	100.0%	-	75.0%	-	100.0%	-	-	-	50.0%	66.7%
	2回目接種後	84.2%	84.6%	73.3%	75.0%	100.0%	81.2%	77.8%	84.6%	88.2%	66.7%	-	83.3%	82.0%

(3) 発熱(37.5℃未満)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃未満)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(0名)	(4名)	(0名)	(1名)	(1名)	(6名)	(3名)	(2名)	(3名)	(0名)	(0名)	(8名)	(14名)
2回目接種後の年代別回答者数		(3名)	(15名)	(10名)	(12名)	(2名)	(42名)	(1名)	(2名)	(7名)	(2名)	(0名)	(12名)	(54名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	33.3%	-	-	25.0%	14.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	8.3%	1.9%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	50.0%	-	-	100.0%	50.0%	33.3%	-	33.3%	-	-	25.0%	35.7%
	2回目接種後	33.3%	26.7%	30.0%	16.7%	-	23.8%	-	50.0%	71.4%	-	-	50.0%	29.6%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	20.0%	8.3%	-	7.1%	-	-	-	-	-	-	5.6%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	50.0%	-	-	-	33.3%	33.3%	100.0%	33.3%	-	-	50.0%	42.9%
	2回目接種後	66.7%	73.3%	50.0%	58.3%	100.0%	64.3%	-	50.0%	28.6%	-	-	25.0%	55.6%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	100.0%	-	16.7%	-	-	-	-	-	-	7.1%
	2回目接種後	-	-	-	8.3%	-	2.4%	100.0%	-	-	50.0%	-	16.7%	5.6%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	8.3%	-	2.4%	-	-	-	-	-	-	1.9%


②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	33.3%	-	-	25.0%	14.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	8.3%	1.9%
接種日の翌日	1回目接種後	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	66.7%	-	-	75.0%	85.7%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	83.3%	96.3%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	8.3%	1.9%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	12.5%	7.1%
	2回目接種後	-	-	-	8.3%	-	2.4%	-	-	-	-	-	-	1.9%
受診しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	-	-	87.5%	92.9%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	91.7%	100.0%	97.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	98.1%

④薬は服用したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	100.0%	16.7%	-	-	-	-	-	-	7.1%
	2回目接種後	66.7%	26.7%	30.0%	16.7%	50.0%	28.6%	-	-	14.3%	-	-	8.3%	24.1%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	10.0%	8.3%	-	4.8%	100.0%	-	42.9%	50.0%	-	41.7%	13.0%
薬は服用しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	100.0%	-	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	100.0%	92.9%
	2回目接種後	33.3%	73.3%	60.0%	75.0%	50.0%	66.7%	-	100.0%	42.9%	50.0%	-	50.0%	63.0%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	-	100.0%	-	100.0%	-	83.3%	66.7%	50.0%	100.0%	-	-	75.0%	78.6%
	2回目接種後	66.7%	80.0%	90.0%	66.7%	50.0%	76.2%	-	50.0%	57.1%	100.0%	-	58.3%	72.2%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	100.0%	16.7%	33.3%	50.0%	-	-	-	25.0%	21.4%
	2回目接種後	33.3%	20.0%	10.0%	33.3%	50.0%	23.8%	100.0%	50.0%	42.9%	-	-	41.7%	27.8%

(4) 倦怠感(だるさ、疲れなど)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎倦怠感(だるさ、疲れなど)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(8名)	(11名)	(5名)	(6名)	(1名)	(31名)	(4名)	(7名)	(4名)	(0名)	(0名)	(15名)	(46名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(23名)	(36名)	(24名)	(21名)	(1名)	(105名)	(9名)	(12名)	(24名)	(5名)	(0名)	(50名)	(155名)	
接種日のみ	1回目接種後	12.5%	-	-	-	-	3.2%	-	-	-	-	-	-	2.2%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	2.0%	0.6%
接種日から翌日まで	1回目接種後	37.5%	27.3%	20.0%	50.0%	-	32.3%	50.0%	71.4%	100.0%	-	-	73.3%	45.7%
	2回目接種後	26.1%	25.0%	29.2%	28.6%	-	26.7%	33.3%	41.7%	25.0%	20.0%	-	30.0%	27.7%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	12.5%	45.5%	40.0%	16.7%	100.0%	32.3%	50.0%	14.3%	-	-	-	20.0%	28.3%
	2回目接種後	13.0%	13.9%	29.2%	9.5%	-	16.2%	22.2%	33.3%	29.2%	-	-	26.0%	19.4%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	37.5%	27.3%	40.0%	16.7%	-	29.0%	-	14.3%	-	-	-	6.7%	21.7%
	2回目接種後	43.5%	38.9%	25.0%	33.3%	-	35.2%	33.3%	16.7%	25.0%	-	-	22.0%	31.0%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	16.7%	-	3.2%	-	-	-	-	-	-	2.2%
	2回目接種後	17.4%	22.2%	16.7%	28.6%	100.0%	21.9%	11.1%	-	20.8%	60.0%	-	18.0%	20.6%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	8.3%	-	-	-	2.0%	0.6%


②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	25.0%	-	-	13.3%	4.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	11.1%	-	4.2%	40.0%	-	8.0%	2.6%
接種日の翌日	1回目接種後	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.8%	100.0%	85.7%	75.0%	-	-	86.7%	93.5%
	2回目接種後	91.3%	97.2%	87.5%	100.0%	100.0%	94.3%	77.8%	91.7%	83.3%	20.0%	-	78.0%	89.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	12.5%	-	-	-	-	3.2%	-	-	-	-	-	-	2.2%
	2回目接種後	8.7%	2.8%	12.5%	-	-	5.7%	11.1%	8.3%	12.5%	40.0%	-	14.0%	8.4%

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計		
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	2.8%	-	-	-	1.0%	-	-	-	-	-	-	0.6%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	97.2%	100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	99.4%

④薬は服用したか。	男性						女性						男女計	
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計		
市販薬を服用した	1回目接種後	12.5%	-	-	-	100.0%	6.5%	-	-	-	-	-	-	4.3%
	2回目接種後	17.4%	13.9%	25.0%	14.3%	-	17.1%	11.1%	-	33.3%	20.0%	-	20.0%	18.1%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	-	-	-	6.7%	2.2%
	2回目接種後	-	2.8%	-	-	-	1.0%	11.1%	8.3%	8.3%	-	-	8.0%	3.2%
薬は服用しなかった	1回目接種後	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	-	93.5%	100.0%	85.7%	100.0%	-	-	93.3%	93.5%
	2回目接種後	82.6%	83.3%	75.0%	85.7%	100.0%	81.9%	77.8%	91.7%	58.3%	80.0%	-	72.0%	78.7%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計		
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	-	90.3%	75.0%	100.0%	75.0%	-	-	86.7%	89.1%
	2回目接種後	39.1%	52.8%	66.7%	61.9%	-	54.3%	33.3%	58.3%	37.5%	40.0%	-	42.0%	50.3%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	33.3%	100.0%	9.7%	25.0%	-	25.0%	-	-	13.3%	10.9%
	2回目接種後	60.9%	47.2%	33.3%	38.1%	100.0%	45.7%	66.7%	41.7%	62.5%	60.0%	-	58.0%	49.7%

(5) 関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(5名)	(6名)	(2名)	(3名)	(1名)	(17名)	(2名)	(4名)	(1名)	(1名)	(0名)	(8名)	(25名)
2回目接種後の年代別回答者数		(16名)	(21名)	(9名)	(13名)	(2名)	(61名)	(7名)	(9名)	(10名)	(3名)	(0名)	(29名)	(90名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	60.0%	33.3%	-	66.7%	-	41.2%	-	50.0%	-	-	-	25.0%	36.0%
	2回目接種後	37.5%	23.8%	11.1%	30.8%	-	26.2%	28.6%	44.4%	10.0%	-	-	24.1%	25.6%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	20.0%	16.7%	50.0%	-	-	17.6%	100.0%	50.0%	100.0%	-	-	62.5%	32.0%
	2回目接種後	6.3%	14.3%	33.3%	7.7%	50.0%	14.8%	28.6%	33.3%	10.0%	33.3%	-	24.1%	17.8%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	16.7%	-	-	-	5.9%	-	-	-	-	-	-	4.0%
	2回目接種後	37.5%	47.6%	33.3%	7.7%	-	32.8%	28.6%	11.1%	40.0%	33.3%	-	27.6%	31.1%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	20.0%	33.3%	50.0%	-	100.0%	29.4%	-	-	-	-	-	-	20.0%
	2回目接種後	18.8%	14.3%	22.2%	46.2%	50.0%	24.6%	14.3%	11.1%	40.0%	33.3%	-	24.1%	24.4%
その他	1回目接種後	-	-	-	33.3%	-	5.9%	-	-	-	100.0%	-	12.5%	8.0%
	2回目接種後	-	-	-	7.7%	-	1.6%	-	-	-	-	-	-	1.1%




②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	20.0%	-	-	-	-	5.9%	50.0%	25.0%	-	-	-	25.0%	12.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日の翌日	1回目接種後	80.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	88.2%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	-	75.0%	84.0%
	2回目接種後	87.5%	95.2%	88.9%	92.3%	100.0%	91.8%	85.7%	100.0%	100.0%	33.3%	-	89.7%	91.1%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	12.5%	4.8%	11.1%	-	-	6.6%	14.3%	-	-	66.7%	-	10.3%	7.8%
その他	1回目接種後	-	-	-	33.3%	-	5.9%	-	-	-	-	-	-	4.0%
	2回目接種後	-	-	-	7.7%	-	1.6%	-	-	-	-	-	-	1.1%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	4.8%	-	-	-	1.6%	-	-	-	-	-	-	1.1%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	95.2%	100.0%	100.0%	100.0%	98.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	98.9%

④薬は服用したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	18.8%	4.8%	22.2%	15.4%	100.0%	16.4%	14.3%	-	50.0%	-	-	20.7%	17.8%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	9.5%	-	7.7%	-	4.9%	14.3%	11.1%	-	-	-	6.9%	5.6%
薬は服用しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	81.3%	85.7%	77.8%	76.9%	-	78.7%	71.4%	88.9%	50.0%	100.0%	-	72.4%	76.7%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	94.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	96.0%
	2回目接種後	37.5%	57.1%	55.6%	53.8%	50.0%	50.8%	14.3%	66.7%	20.0%	66.7%	-	37.9%	46.7%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	33.3%	-	5.9%	-	-	-	-	-	-	4.0%
	2回目接種後	62.5%	42.9%	44.4%	46.2%	50.0%	49.2%	85.7%	33.3%	80.0%	33.3%	-	62.1%	53.3%

(6) めまいの発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎めまいの症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(1名)	(2名)	(0名)	(0名)	(3名)	(4名)
2回目接種後の年代別回答者数	(5名)	(3名)	(3名)	(2名)	(0名)	(13名)	(2名)	(0名)	(5名)	(0名)	(0名)	(7名)	(20名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	66.7%	50.0%
	2回目接種後	20.0%	-	-	-	-	7.7%	-	-	20.0%	-	14.3%	10.0%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	33.3%	25.0%
	2回目接種後	-	66.7%	66.7%	-	-	30.8%	-	-	40.0%	-	28.6%	30.0%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	-	25.0%
	2回目接種後	80.0%	33.3%	33.3%	-	-	46.2%	50.0%	-	40.0%	-	42.9%	45.0%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	50.0%	-	7.7%	50.0%	-	-	-	14.3%	10.0%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	50.0%	-	7.7%	-	-	-	-	-	5.0%


②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	14.3%	5.0%
接種日の翌日	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	100.0%	-	-	100.0%	-	66.7%	75.0%
	2回目接種後	100.0%	66.7%	33.3%	50.0%	-	69.2%	100.0%	-	60.0%	-	71.4%	70.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	33.3%	25.0%
	2回目接種後	-	33.3%	66.7%	50.0%	-	30.8%	-	-	20.0%	-	14.3%	25.0%

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	33.3%	-	-	-	7.7%	-	-	-	-	-	5.0%
受診しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	-	92.3%	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	95.0%

④薬は服用したか。	男性						女性						男女計
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	20.0%	-	33.3%	-	-	15.4%	50.0%	-	-	-	14.3%	15.0%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	20.0%	-	28.6%	10.0%
薬は服用しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	80.0%	100.0%	66.7%	100.0%	-	84.6%	-	-	80.0%	-	57.1%	75.0%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	-	100.0%	-	-	-	100.0%	-	-	50.0%	-	33.3%	50.0%
	2回目接種後	40.0%	33.3%	66.7%	100.0%	-	53.8%	-	-	60.0%	-	42.9%	50.0%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	50.0%	-	66.7%	50.0%
	2回目接種後	60.0%	66.7%	33.3%	-	-	46.2%	100.0%	-	40.0%	-	57.1%	50.0%

(7) 頭痛の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎頭痛の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(1名)	(3名)	(3名)	(2名)	(2名)	(11名)	(3名)	(6名)	(3名)	(0名)	(0名)	(12名)	(23名)
2回目接種後の年代別回答者数		(14名)	(18名)	(14名)	(7名)	(0名)	(53名)	(7名)	(5名)	(18名)	(2名)	(0名)	(32名)	(85名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	33.3%	-	-	9.1%	-	16.7%	-	-	-	8.3%	8.7%
	2回目接種後	-	5.6%	-	-	-	1.9%	-	-	-	-	-	-	1.2%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	50.0%	-	9.1%	66.7%	16.7%	66.7%	-	-	41.7%	26.1%
	2回目接種後	21.4%	16.7%	21.4%	14.3%	-	18.9%	71.4%	20.0%	33.3%	-	-	37.5%	25.9%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	50.0%	9.1%	33.3%	33.3%	33.3%	-	-	33.3%	21.7%
	2回目接種後	7.1%	16.7%	28.6%	28.6%	-	18.9%	-	40.0%	5.6%	-	-	9.4%	15.3%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	100.0%	100.0%	33.3%	-	50.0%	54.5%	-	16.7%	-	-	-	8.3%	30.4%
	2回目接種後	28.6%	33.3%	35.7%	28.6%	-	32.1%	14.3%	-	50.0%	50.0%	-	34.4%	32.9%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	33.3%	50.0%	-	18.2%	-	16.7%	-	-	-	8.3%	13.0%
	2回目接種後	42.9%	22.2%	14.3%	14.3%	-	24.5%	14.3%	40.0%	11.1%	50.0%	-	18.8%	22.4%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	5.6%	-	14.3%	-	3.8%	-	-	-	-	-	-	2.4%

②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	33.3%	50.0%	-	18.2%	66.7%	33.3%	33.3%	-	-	41.7%	30.4%
	2回目接種後	7.1%	11.1%	-	-	-	5.7%	14.3%	-	5.6%	-	-	6.3%	5.9%
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	100.0%	33.3%	50.0%	100.0%	72.7%	33.3%	50.0%	66.7%	-	-	50.0%	60.9%
	2回目接種後	85.7%	72.2%	78.6%	85.7%	-	79.2%	71.4%	80.0%	88.9%	50.0%	-	81.3%	80.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	33.3%	-	-	9.1%	-	16.7%	-	-	-	8.3%	8.7%
	2回目接種後	7.1%	16.7%	21.4%	14.3%	-	15.1%	14.3%	20.0%	5.6%	50.0%	-	12.5%	14.1%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	8.3%	4.3%
	2回目接種後	-	5.6%	-	-	-	1.9%	-	-	-	-	-	-	1.2%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	-	-	91.7%	95.7%
	2回目接種後	100.0%	94.4%	100.0%	100.0%	-	98.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	98.8%

④薬は服用したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	100.0%	33.3%	100.0%	-	50.0%	54.5%	33.3%	-	33.3%	-	-	16.7%	34.8%
	2回目接種後	35.7%	27.8%	64.3%	-	-	35.8%	28.6%	40.0%	66.7%	50.0%	-	53.1%	42.4%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	33.3%	-	-	-	9.1%	33.3%	33.3%	33.3%	-	-	33.3%	21.7%
	2回目接種後	7.1%	16.7%	7.1%	14.3%	-	11.3%	42.9%	20.0%	5.6%	-	-	15.6%	12.9%
薬は服用しなかった	1回目接種後	-	33.3%	-	100.0%	50.0%	36.4%	33.3%	66.7%	33.3%	-	-	50.0%	43.5%
	2回目接種後	57.1%	55.6%	28.6%	85.7%	-	52.8%	28.6%	40.0%	27.8%	50.0%	-	31.3%	44.7%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	50.0%	81.8%	66.7%	50.0%	33.3%	-	-	50.0%	65.2%
	2回目接種後	28.6%	44.4%	50.0%	57.1%	-	43.4%	14.3%	80.0%	44.4%	100.0%	-	46.9%	44.7%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	33.3%	-	-	50.0%	18.2%	33.3%	50.0%	66.7%	-	-	50.0%	34.8%
	2回目接種後	71.4%	55.6%	50.0%	42.9%	-	56.6%	85.7%	20.0%	55.6%	-	-	53.1%	55.3%

(8) その他(悪寒、手のしびれ、吐き気、下痢、腰痛、腹痛など)に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(1名)	(1名)	(3名)	(0名)	(0名)	(5名)	(6名)
2回目接種後の年代別回答者数		(0名)	(3名)	(0名)	(1名)	(0名)	(4名)	(4名)	(1名)	(4名)	(0名)	(0名)	(9名)	(13名)
接種日のみ	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	-	-	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	75.0%	-	25.0%	-	-	44.4%	30.8%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	33.3%	-	-	-	25.0%	-	-	25.0%	-	-	11.1%	15.4%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	66.7%	-	-	-	50.0%	-	-	50.0%	-	-	22.2%	30.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	100.0%	-	25.0%	25.0%	100.0%	-	-	-	22.2%	23.1%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
接種当日	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	-	-	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	66.7%	-	-	60.0%	50.0%
	2回目接種後	-	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	75.0%	100.0%	75.0%	-	-	77.8%	84.6%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	33.3%	-	-	40.0%	33.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	25.0%	-	-	22.2%	15.4%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	33.3%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	7.7%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	-	-	80.0%	83.3%
	2回目接種後	-	66.7%	-	100.0%	-	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	100.0%	92.3%

④薬は服用したか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	11.1%	7.7%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	11.1%	7.7%
薬は服用しなかった	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	-	-	80.0%	83.3%
	2回目接種後	-	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	75.0%	100.0%	75.0%	-	-	77.8%	84.6%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計
		20代	30代	40代	50代	60代	計	20代	30代	40代	50代	60代	計	
我慢できる程度で、普段通りの生活(仕事)が出来る状態だった	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	-	100.0%	33.3%	-	-	40.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	100.0%	-	25.0%	25.0%	100.0%	25.0%	-	-	33.3%	30.8%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	66.7%	-	-	60.0%	50.0%
	2回目接種後	-	100.0%	-	-	-	75.0%	75.0%	-	75.0%	-	-	66.7%	69.2%