


# 【市内高校生】新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応にかかる詳細調査結果

## 1. 副反応ごとの発症割合グラフ(下表の年代別男女計の発症割合)




## ◎接種後における副反応別のアンケート結果(複数回答)

主な副反応の区分		男性(年代別回答者数)					女性(年代別回答者数)					全体の発症割合/数	【参考】市職員
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計		
	1回目接種後の年代別回答者数	(21名)	(19名)	(19名)	(3名)	(62名)	(21名)	(37名)	(30名)	(11名)	(99名)	(161名)	(265名)
	2回目接種後の年代別回答者数	(21名)	(19名)	(19名)	(3名)	(62名)	(21名)	(36名)	(29名)	(11名)	(97名)	(159名)	(254名)
(1)接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	1回目接種後	67%	63%	79%	67%	69%	71%	81%	73%	73%	76%	73.3%	90.2%
	2回目接種後	67%	68%	74%	67%	69%	67%	78%	76%	64%	73%	71.7%	80.7%
(2)発熱(37.5℃以上)	1回目接種後	29%	26%	0%	0%	18%	5%	14%	7%	0%	8%	11.8%	2.3%
	2回目接種後	48%	63%	53%	0%	52%	67%	67%	52%	36%	59%	56.0%	43.7%
(3)発熱(37.5℃未満)	1回目接種後	5%	21%	16%	0%	13%	5%	11%	10%	9%	9%	10.6%	5.3%
	2回目接種後	19%	16%	16%	33%	18%	10%	17%	24%	27%	19%	18.2%	21.3%
(4)倦怠感(だるさ、疲れなど)	1回目接種後	33%	42%	26%	33%	34%	14%	38%	23%	9%	25%	28.6%	17.4%
	2回目接種後	48%	84%	58%	33%	61%	48%	61%	69%	45%	59%	59.7%	61.0%
(5)関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	1回目接種後	14%	5%	11%	0%	10%	19%	19%	13%	18%	17%	14.3%	9.4%
	2回目接種後	19%	32%	37%	0%	27%	29%	33%	31%	45%	33%	30.8%	35.4%
(6)めまい	1回目接種後	0%	5%	0%	0%	2%	0%	8%	3%	9%	5%	3.7%	1.5%
	2回目接種後	10%	21%	11%	0%	13%	19%	17%	24%	0%	18%	15.7%	7.9%
(7)頭痛	1回目接種後	29%	16%	16%	0%	19%	10%	22%	27%	27%	21%	20.5%	8.7%
	2回目接種後	43%	47%	53%	0%	45%	71%	56%	72%	55%	64%	56.6%	33.5%
(8)その他(耳のかゆみ・痛み、肩の痛み、下痢、吐き気、胸の痛み、喘息の発作など)	1回目接種後	0%	5%	5%	0%	3%	0%	0%	7%	9%	3%	3.1%	2.3%
	2回目接種後	5%	16%	5%	0%	8%	0%	8%	7%	9%	6%	6.9%	5.1%
(9)特に何もなかった	1回目接種後	19%	0%	16%	33%	13%	14%	14%	20%	0%	14%	13.7%	5.7%
	2回目接種後	14%	0%	11%	0%	8%	14%	3%	7%	0%	6%	6.9%	2.8%

※参考までに右欄に市職員の副反応発症割合と人数も入れてます。

## 2. 接種後の副反応ごとの状況について

### (1) 接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



### ◎接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
	15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(14名)	(12名)	(15名)	(2名)	(43名)	(15名)	(30名)	(22名)	(8名)	(75名)	(118名)
2回目接種後の年代別回答者数	(14名)	(13名)	(14名)	(2名)	(43名)	(14名)	(28名)	(22名)	(7名)	(71名)	(114名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	50.0%	2.3%	6.7%	3.3%	4.5%	-	4.0%	3.4%
	2回目接種後	-	-	7.1%	-	2.3%	7.1%	-	4.5%	2.8%	2.6%
接種日から翌日まで	1回目接種後	50.0%	58.3%	53.3%	50.0%	53.5%	13.3%	26.7%	27.3%	12.5%	22.7%
	2回目接種後	35.7%	53.8%	35.7%	100.0%	44.2%	14.3%	21.4%	18.2%	14.3%	18.3%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	21.4%	25.0%	40.0%	-	27.9%	60.0%	46.7%	36.4%	75.0%	49.3%
	2回目接種後	28.6%	30.8%	50.0%	-	34.9%	42.9%	42.9%	54.5%	71.4%	49.3%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	14.3%	16.7%	6.7%	-	11.6%	-	-	9.1%	-	2.7%
	2回目接種後	7.1%	-	-	-	2.3%	-	10.7%	-	-	4.2%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	14.3%	-	-	-	4.7%	20.0%	20.0%	18.2%	12.5%	18.7%
	2回目接種後	21.4%	15.4%	7.1%	-	14.0%	28.6%	25.0%	9.1%	14.3%	19.7%
その他(4~5日間)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	3.3%	4.5%	-	2.7%
	2回目接種後	7.1%	-	-	-	2.3%	7.1%	-	13.6%	-	5.6%

②ピークはいつだったか。	男性					女性					男女計	
	15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計		
接種当日	1回目接種後	7.1%	25.0%	20.0%	50.0%	18.6%	6.7%	6.7%	13.6%	-	8.0%	11.9%
	2回目接種後	7.1%	-	14.3%	50.0%	9.3%	7.1%	7.1%	22.7%	14.3%	12.7%	11.4%
接種日の翌日	1回目接種後	85.7%	75.0%	73.3%	50.0%	76.7%	93.3%	93.3%	81.8%	100.0%	90.7%	85.6%
	2回目接種後	85.7%	92.3%	85.7%	-	83.7%	85.7%	78.6%	59.1%	71.4%	73.2%	77.2%
接種日の翌々日	1回目接種後	7.1%	-	6.7%	-	4.7%	-	-	4.5%	-	1.3%	2.5%
	2回目接種後	7.1%	7.7%	-	50.0%	7.0%	7.1%	14.3%	18.2%	14.3%	14.1%	11.4%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


③病院を受診したか。	男性					女性					男女計	
	15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計		
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

④薬は服用したか。	男性					女性					男女計	
	15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計		
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	6.7%	6.7%	4.5%	-	5.3%	3.4%
	2回目接種後	7.1%	7.7%	28.6%	-	14.0%	14.3%	3.6%	9.1%	14.3%	8.5%	10.5%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	8.3%	6.7%	-	4.7%	-	6.7%	-	-	2.7%	3.4%
	2回目接種後	7.1%	7.7%	14.3%	-	9.3%	14.3%	7.1%	-	14.3%	7.0%	7.9%
薬は服用しなかった	1回目接種後	100.0%	91.7%	93.3%	100.0%	95.3%	93.3%	86.7%	95.5%	100.0%	92.0%	93.2%
	2回目接種後	85.7%	84.6%	57.1%	100.0%	76.7%	71.4%	89.3%	90.9%	71.4%	84.5%	81.6%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性					女性					男女計	
	15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	100.0%	83.3%	86.7%	100.0%	90.7%	100.0%	90.0%	86.4%	100.0%	92.0%	91.5%
	2回目接種後	78.6%	76.9%	71.4%	100.0%	76.7%	85.7%	75.0%	68.2%	71.4%	74.6%	75.4%
痛みがひどく生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	-	16.7%	13.3%	-	9.3%	-	10.0%	13.6%	-	8.0%	8.5%
	2回目接種後	21.4%	23.1%	28.6%	-	23.3%	14.3%	25.0%	31.8%	28.6%	25.4%	24.6%



(2) 発熱(37.5℃以上)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃以上)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(6名)	(5名)	(0名)	(0名)	(11名)	(1名)	(5名)	(2名)	(0名)	(8名)	(19名)
2回目接種後の年代別回答者数		(10名)	(12名)	(10名)	(0名)	(32名)	(14名)	(24名)	(15名)	(4名)	(57名)	(89名)
接種日のみ	1回目接種後	16.7%	-	-	-	9.1%	-	-	-	-	-	5.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	33.3%	60.0%	-	-	45.5%	100.0%	40.0%	-	-	37.5%	42.1%
	2回目接種後	10.0%	41.7%	50.0%	-	34.4%	42.9%	20.8%	40.0%	25.0%	31.6%	32.6%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	16.7%	-	-	-	9.1%	-	-	-	-	-	5.3%
	2回目接種後	20.0%	16.7%	20.0%	-	18.8%	14.3%	25.0%	6.7%	50.0%	19.3%	19.1%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	33.3%	40.0%	-	-	36.4%	-	20.0%	50.0%	-	25.0%	31.6%
	2回目接種後	20.0%	8.3%	20.0%	-	15.6%	28.6%	25.0%	26.7%	-	24.6%	21.3%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	50.0%	-	25.0%	10.5%
	2回目接種後	20.0%	-	-	-	6.3%	14.3%	25.0%	26.7%	25.0%	22.8%	16.9%
その他(4~5日間)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	12.5%	5.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	4.2%	-	-	1.8%	1.1%


②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	-	20.0%	-	-	9.1%	-	20.0%	-	-	12.5%	10.5%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	4.2%	6.7%	-	3.5%	2.2%
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	80.0%	-	-	90.9%	100.0%	60.0%	100.0%	-	75.0%	84.2%
	2回目接種後	90.0%	100.0%	80.0%	-	90.6%	100.0%	87.5%	86.7%	100.0%	91.2%	91.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	12.5%	5.3%
	2回目接種後	10.0%	-	10.0%	-	6.3%	-	8.3%	6.7%	-	5.3%	5.6%
その他(不定期)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	10.0%	-	3.1%	-	-	-	-	-	1.1%

③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	4.2%	-	-	1.8%	1.1%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	95.8%	100.0%	100.0%	98.2%	98.9%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	16.7%	-	-	-	9.1%	-	40.0%	-	-	25.0%	15.8%
	2回目接種後	40.0%	41.7%	50.0%	-	43.8%	35.7%	45.8%	40.0%	25.0%	40.4%	41.6%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	33.3%	40.0%	-	-	36.4%	-	40.0%	-	-	25.0%	31.6%
	2回目接種後	50.0%	25.0%	10.0%	-	28.1%	35.7%	41.7%	20.0%	75.0%	36.8%	33.7%
薬は服用しなかった	1回目接種後	50.0%	60.0%	-	-	54.5%	100.0%	20.0%	100.0%	-	50.0%	52.6%
	2回目接種後	10.0%	33.3%	40.0%	-	28.1%	28.6%	12.5%	40.0%	-	22.8%	24.7%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	16.7%	40.0%	-	-	27.3%	100.0%	20.0%	50.0%	-	37.5%	31.6%
	2回目接種後	10.0%	16.7%	60.0%	-	28.1%	64.3%	20.8%	26.7%	25.0%	33.3%	31.5%
高熱により生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	83.3%	60.0%	-	-	72.7%	-	80.0%	50.0%	-	62.5%	68.4%
	2回目接種後	90.0%	83.3%	40.0%	-	71.9%	35.7%	79.2%	73.3%	75.0%	66.7%	68.5%

(3) 発熱(37.5℃未満)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃未満)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(1名)	(4名)	(3名)	(0名)	(8名)	(1名)	(4名)	(3名)	(1名)	(9名)	(17名)
2回目接種後の年代別回答者数		(4名)	(3名)	(3名)	(1名)	(11名)	(2名)	(6名)	(7名)	(3名)	(18名)	(29名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	50.0%	33.3%	-	33.3%	17.6%
	2回目接種後	-	66.7%	-	-	18.2%	50.0%	16.7%	-	-	11.1%	13.8%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	75.0%	33.3%	-	50.0%	-	50.0%	33.3%	100.0%	44.4%	47.1%
	2回目接種後	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	63.6%	-	50.0%	42.9%	33.3%	38.9%	48.3%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	33.3%	-	12.5%	-	-	33.3%	-	11.1%	11.8%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	28.6%	-	11.1%	6.9%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	100.0%	25.0%	33.3%	-	37.5%	100.0%	-	-	-	11.1%	23.5%
	2回目接種後	-	-	66.7%	-	18.2%	50.0%	33.3%	14.3%	66.7%	33.3%	27.6%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	-	5.6%	3.4%


②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	-	75.0%	-	-	37.5%	-	25.0%	33.3%	-	22.2%	29.4%
	2回目接種後	-	100.0%	-	-	27.3%	50.0%	16.7%	-	-	11.1%	17.2%
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	25.0%	66.7%	-	50.0%	100.0%	75.0%	66.7%	100.0%	77.8%	64.7%
	2回目接種後	100.0%	-	100.0%	100.0%	72.7%	50.0%	83.3%	85.7%	100.0%	83.3%	79.3%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	33.3%	-	12.5%	-	-	-	-	-	5.9%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	-	5.6%	3.4%

③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	25.0%	-	-	12.5%	-	-	100.0%	100.0%	44.4%	29.4%
	2回目接種後	25.0%	-	-	100.0%	18.2%	50.0%	16.7%	57.1%	-	33.3%	27.6%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	33.3%	-	12.5%	-	-	-	-	-	5.9%
	2回目接種後	50.0%	-	-	-	18.2%	-	33.3%	14.3%	-	16.7%	17.2%
薬は服用しなかった	1回目接種後	100.0%	75.0%	66.7%	-	75.0%	100.0%	100.0%	-	-	55.6%	64.7%
	2回目接種後	25.0%	100.0%	100.0%	-	63.6%	50.0%	50.0%	28.6%	100.0%	50.0%	55.2%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	100.0%	75.0%	33.3%	-	62.5%	100.0%	75.0%	33.3%	-	55.6%	58.8%
	2回目接種後	75.0%	100.0%	66.7%	100.0%	81.8%	50.0%	83.3%	42.9%	66.7%	61.1%	69.0%
発熱により生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	-	25.0%	66.7%	-	37.5%	-	25.0%	66.7%	100.0%	44.4%	41.2%
	2回目接種後	25.0%	-	33.3%	-	18.2%	50.0%	16.7%	57.1%	33.3%	38.9%	31.0%

(4) 倦怠感(だるさ、疲れなど)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎倦怠感(だるさ、疲れなど)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(7名)	(8名)	(5名)	(1名)	(21名)	(3名)	(14名)	(7名)	(1名)	(25名)	(46名)
2回目接種後の年代別回答者数		(10名)	(16名)	(11名)	(1名)	(38名)	(10名)	(22名)	(20名)	(5名)	(57名)	(95名)
接種日のみ	1回目接種後	-	37.5%	-	-	14.3%	-	-	14.3%	-	4.0%	8.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	28.6%	25.0%	40.0%	-	28.6%	33.3%	50.0%	42.9%	100.0%	48.0%	39.1%
	2回目接種後	10.0%	37.5%	45.5%	-	31.6%	10.0%	18.2%	25.0%	40.0%	21.1%	25.3%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	28.6%	25.0%	20.0%	100.0%	28.6%	66.7%	21.4%	-	-	20.0%	23.9%
	2回目接種後	50.0%	25.0%	36.4%	100.0%	36.8%	30.0%	31.8%	45.0%	20.0%	35.1%	35.8%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	12.5%	-	-	4.8%	-	-	14.3%	-	4.0%	4.3%
	2回目接種後	10.0%	31.3%	9.1%	-	18.4%	10.0%	18.2%	10.0%	-	12.3%	14.7%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	42.9%	-	40.0%	-	23.8%	-	21.4%	28.6%	-	20.0%	21.7%
	2回目接種後	20.0%	6.3%	9.1%	-	10.5%	50.0%	18.2%	20.0%	40.0%	26.3%	20.0%
その他(4~5日間)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	7.1%	-	-	4.0%	2.2%
	2回目接種後	10.0%	-	-	-	2.6%	-	13.6%	-	-	5.3%	4.2%

②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	-	50.0%	-	-	19.0%	33.3%	14.3%	14.3%	-	16.0%	17.4%
	2回目接種後	-	6.3%	-	-	2.6%	-	-	5.0%	-	1.8%	2.1%
接種日の翌日	1回目接種後	71.4%	50.0%	60.0%	100.0%	61.9%	66.7%	64.3%	57.1%	100.0%	64.0%	63.0%
	2回目接種後	80.0%	87.5%	81.8%	100.0%	84.2%	90.0%	86.4%	80.0%	80.0%	84.2%	84.2%
接種日の翌々日	1回目接種後	28.6%	-	40.0%	-	19.0%	-	14.3%	28.6%	-	16.0%	17.4%
	2回目接種後	10.0%	6.3%	9.1%	-	7.9%	10.0%	13.6%	10.0%	20.0%	12.3%	10.5%
その他(3~4日後まで、不定期)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	7.1%	-	-	4.0%	2.2%
	2回目接種後	10.0%	-	9.1%	-	5.3%	-	-	5.0%	-	1.8%	3.2%


③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	4.5%	-	-	1.8%	1.1%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.5%	100.0%	100.0%	98.2%	98.9%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	20.0%	-	4.8%	-	7.1%	-	-	4.0%	4.3%
	2回目接種後	10.0%	18.8%	45.5%	-	23.7%	40.0%	22.7%	20.0%	-	22.8%	23.2%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	14.3%	-	-	-	4.8%	-	7.1%	-	-	4.0%	4.3%
	2回目接種後	20.0%	12.5%	9.1%	-	13.2%	-	18.2%	10.0%	40.0%	14.0%	13.7%
薬は服用しなかった	1回目接種後	85.7%	100.0%	80.0%	100.0%	90.5%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	92.0%	91.3%
	2回目接種後	70.0%	68.8%	45.5%	100.0%	63.2%	60.0%	59.1%	70.0%	60.0%	63.2%	63.2%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	57.1%	62.5%	40.0%	100.0%	57.1%	100.0%	57.1%	71.4%	100.0%	68.0%	63.0%
	2回目接種後	30.0%	56.3%	54.5%	100.0%	50.0%	60.0%	40.9%	35.0%	20.0%	40.4%	44.2%
症状がひどく生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	42.9%	37.5%	60.0%	-	42.9%	-	42.9%	28.6%	-	32.0%	37.0%
	2回目接種後	70.0%	43.8%	45.5%	-	50.0%	40.0%	59.1%	65.0%	80.0%	59.6%	55.8%



(5) 関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(3名)	(1名)	(2名)	(0名)	(6名)	(4名)	(7名)	(4名)	(2名)	(17名)	(23名)
2回目接種後の年代別回答者数		(4名)	(6名)	(7名)	(0名)	(17名)	(6名)	(12名)	(9名)	(5名)	(32名)	(49名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	33.3%	100.0%	-	-	33.3%	75.0%	42.9%	25.0%	50.0%	47.1%	43.5%
	2回目接種後	-	33.3%	71.4%	-	41.2%	33.3%	16.7%	33.3%	20.0%	25.0%	30.6%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	33.3%	-	50.0%	-	33.3%	-	28.6%	25.0%	-	17.6%	21.7%
	2回目接種後	25.0%	33.3%	-	-	17.6%	33.3%	25.0%	33.3%	40.0%	31.3%	26.5%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	50.0%	-	16.7%	-	-	25.0%	50.0%	11.8%	13.0%
	2回目接種後	-	16.7%	14.3%	-	11.8%	-	25.0%	22.2%	20.0%	18.8%	16.3%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	33.3%	-	-	-	16.7%	25.0%	28.6%	-	-	17.6%	17.4%
	2回目接種後	75.0%	16.7%	14.3%	-	29.4%	33.3%	33.3%	11.1%	20.0%	25.0%	26.5%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	5.9%	4.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	25.0%	14.3%	-	-	11.8%	8.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	16.7%	-	-	-	3.1%	2.0%
接種日の翌日	1回目接種後	66.7%	100.0%	100.0%	-	83.3%	75.0%	57.1%	75.0%	100.0%	70.6%	73.9%
	2回目接種後	25.0%	83.3%	100.0%	-	76.5%	83.3%	75.0%	100.0%	100.0%	87.5%	83.7%
接種日の翌々日	1回目接種後	33.3%	-	-	-	16.7%	-	28.6%	25.0%	-	17.6%	17.4%
	2回目接種後	75.0%	16.7%	-	-	23.5%	-	25.0%	-	-	9.4%	14.3%

③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	28.6%	-	-	11.8%	8.7%
	2回目接種後	-	33.3%	14.3%	-	17.6%	16.7%	16.7%	-	-	9.4%	12.2%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	25.0%	-	14.3%	-	11.8%	-	25.0%	11.1%	20.0%	15.6%	14.3%
薬は服用しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	71.4%	100.0%	100.0%	88.2%	91.3%
	2回目接種後	75.0%	66.7%	71.4%	-	70.6%	83.3%	58.3%	88.9%	80.0%	75.0%	73.5%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	33.3%	100.0%	-	-	33.3%	100.0%	28.6%	100.0%	100.0%	70.6%	60.9%
	2回目接種後	25.0%	66.7%	57.1%	-	52.9%	83.3%	25.0%	66.7%	80.0%	56.3%	55.1%
痛みがひどく生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	66.7%	-	100.0%	-	66.7%	-	71.4%	-	-	29.4%	39.1%
	2回目接種後	75.0%	33.3%	42.9%	-	47.1%	16.7%	75.0%	33.3%	20.0%	43.8%	44.9%

(6) めまいの発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎めまいの症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(3名)	(1名)	(1名)	(5名)	(6名)
2回目接種後の年代別回答者数		(2名)	(4名)	(2名)	(0名)	(8名)	(4名)	(6名)	(7名)	(0名)	(17名)	(25名)
接種日のみ	1回目接種後	-	100.0%	-	-	100.0%	-	33.3%	-	100.0%	40.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	25.0%	50.0%	-	25.0%	25.0%	33.3%	14.3%	-	23.5%	24.0%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	50.0%	25.0%	50.0%	-	37.5%	25.0%	33.3%	28.6%	-	29.4%	32.0%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	50.0%	-	-	25.0%	50.0%	-	-	-	11.8%	16.0%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	50.0%	-	-	-	12.5%	-	16.7%	57.1%	-	29.4%	24.0%
その他(4~5日)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	16.7%	-	-	5.9%	4.0%


②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	-	100.0%	-	-	100.0%	-	33.3%	-	100.0%	40.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	50.0%	100.0%	50.0%	-	75.0%	100.0%	83.3%	85.7%	-	88.2%	84.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	50.0%	-	50.0%	-	25.0%	-	16.7%	14.3%	-	11.8%	16.0%
その他(4~5日)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	16.7%	-	-	5.9%	4.0%
受診しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	83.3%	100.0%	-	94.1%	96.0%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	25.0%	50.0%	-	25.0%	25.0%	16.7%	28.6%	-	23.5%	24.0%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	50.0%	-	-	-	12.5%	-	16.7%	-	-	5.9%	8.0%
薬は服用しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	50.0%	75.0%	50.0%	-	62.5%	75.0%	66.7%	71.4%	-	70.6%	68.0%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	-	100.0%	-	-	100.0%	-	33.3%	100.0%	100.0%	60.0%	66.7%
	2回目接種後	-	50.0%	-	-	25.0%	50.0%	50.0%	14.3%	-	35.3%	32.0%
症状がひどく生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	66.7%	-	-	40.0%	33.3%
	2回目接種後	100.0%	50.0%	100.0%	-	75.0%	50.0%	50.0%	85.7%	-	64.7%	68.0%

(7) 頭痛の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎頭痛の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(6名)	(3名)	(3名)	(0名)	(12名)	(2名)	(8名)	(8名)	(3名)	(21名)	(33名)
2回目接種後の年代別回答者数		(9名)	(9名)	(10名)	(0名)	(28名)	(15名)	(20名)	(21名)	(6名)	(62名)	(90名)
接種日のみ	1回目接種後	-	33.3%	-	-	8.3%	100.0%	-	12.5%	-	14.3%	12.1%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	33.3%	33.3%	100.0%	-	50.0%	-	37.5%	50.0%	100.0%	47.6%	48.5%
	2回目接種後	11.1%	33.3%	60.0%	-	35.7%	26.7%	15.0%	28.6%	33.3%	24.2%	27.8%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	33.3%	-	-	-	16.7%	-	37.5%	-	-	14.3%	15.2%
	2回目接種後	22.2%	44.4%	20.0%	-	28.6%	26.7%	30.0%	23.8%	16.7%	25.8%	26.7%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	16.7%	-	-	-	8.3%	-	-	-	-	-	3.0%
	2回目接種後	22.2%	11.1%	20.0%	-	17.9%	13.3%	25.0%	14.3%	16.7%	17.7%	17.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	16.7%	33.3%	-	-	16.7%	-	25.0%	12.5%	-	14.3%	15.2%
	2回目接種後	33.3%	11.1%	-	-	14.3%	26.7%	30.0%	23.8%	33.3%	27.4%	23.3%
その他(3~7日間程)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	9.5%	6.1%
	2回目接種後	11.1%	-	-	-	3.6%	6.7%	-	9.5%	-	4.8%	4.4%

②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	16.7%	33.3%	-	-	16.7%	100.0%	12.5%	37.5%	33.3%	33.3%	27.3%
	2回目接種後	-	11.1%	-	-	3.6%	6.7%	5.0%	-	-	3.2%	3.3%
接種日の翌日	1回目接種後	66.7%	66.7%	100.0%	-	75.0%	-	62.5%	50.0%	66.7%	52.4%	60.6%
	2回目接種後	88.9%	66.7%	100.0%	-	85.7%	86.7%	75.0%	76.2%	66.7%	77.4%	80.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	16.7%	-	-	-	8.3%	-	25.0%	-	-	9.5%	9.1%
	2回目接種後	11.1%	22.2%	-	-	10.7%	6.7%	20.0%	14.3%	33.3%	16.1%	14.4%
その他(5日間続いた)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	4.8%	3.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	9.5%	-	3.2%	2.2%

③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	4.8%	3.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	5.0%	4.8%	-	3.2%	2.2%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	87.5%	100.0%	95.2%	97.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	95.0%	95.2%	100.0%	96.8%	97.8%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	33.3%	33.3%	33.3%	-	33.3%	50.0%	37.5%	50.0%	-	38.1%	36.4%
	2回目接種後	22.2%	44.4%	40.0%	-	35.7%	33.3%	45.0%	33.3%	33.3%	37.1%	36.7%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	16.7%	33.3%	-	-	16.7%	-	37.5%	12.5%	66.7%	28.6%	24.2%
	2回目接種後	44.4%	33.3%	20.0%	-	32.1%	20.0%	25.0%	23.8%	66.7%	27.4%	28.9%
薬は服用しなかった	1回目接種後	50.0%	33.3%	66.7%	-	50.0%	50.0%	25.0%	37.5%	33.3%	33.3%	39.4%
	2回目接種後	33.3%	22.2%	40.0%	-	32.1%	46.7%	30.0%	42.9%	-	35.5%	34.4%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	66.7%	33.3%	33.3%	-	50.0%	100.0%	37.5%	62.5%	100.0%	61.9%	57.6%
	2回目接種後	33.3%	22.2%	50.0%	-	35.7%	66.7%	25.0%	33.3%	33.3%	38.7%	37.8%
痛みがひどく生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	33.3%	66.7%	66.7%	-	50.0%	-	62.5%	37.5%	-	38.1%	42.4%
	2回目接種後	66.7%	77.8%	50.0%	-	64.3%	33.3%	75.0%	66.7%	66.7%	61.3%	62.2%



## (8) その他(耳のかゆみ・痛み、肩の痛み、下痢、吐き気、胸の痛み、喘息の発作など)に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)					女性(副反応があった人数)					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(0名)	(1名)	(1名)	(0名)	(2名)	(0名)	(0名)	(2名)	(1名)	(3名)	(5名)
2回目接種後の年代別回答者数		(1名)	(3名)	(1名)	(0名)	(5名)	(0名)	(3名)	(2名)	(1名)	(6名)	(11名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	60.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	100.0%	33.3%	18.2%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	100.0%	-	20.0%	-	66.7%	-	-	33.3%	27.3%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	66.7%	-	-	40.0%	-	-	-	-	-	18.2%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	100.0%	100.0%	-	100.0%	-	-	-	-	-	40.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	50.0%	-	33.3%	18.2%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	100.0%	33.3%	-	-	40.0%	-	-	-	-	-	18.2%

②ピークはいつだったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	16.7%	9.1%
接種日の翌日	1回目接種後	-	100.0%	-	-	50.0%	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	-	66.7%	50.0%	-	50.0%	72.7%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	100.0%	-	50.0%	-	-	-	-	-	20.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	50.0%	-	33.3%	18.2%


③病院を受診したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	100.0%	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	9.1%
受診しなかった	1回目接種後	-	100.0%	100.0%	-	100.0%	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	-	100.0%	100.0%	-	80.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.9%

④薬は服用したか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
市販薬を服用した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	50.0%	-	33.3%	18.2%
医療機関で処方された薬を服用した	1回目接種後	-	-	100.0%	-	50.0%	-	-	-	100.0%	33.3%	40.0%
	2回目接種後	-	-	100.0%	-	20.0%	-	-	-	100.0%	16.7%	18.2%
薬は服用しなかった	1回目接種後	-	100.0%	-	-	50.0%	-	-	100.0%	-	66.7%	60.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	-	-	80.0%	-	66.7%	50.0%	-	50.0%	63.6%

⑤症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性					女性					男女計
		15歳	16歳	17歳	18歳	計	15歳	16歳	17歳	18歳	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活や学校への登校も出来た	1回目接種後	-	100.0%	100.0%	-	100.0%	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	-	-	100.0%	-	20.0%	-	-	-	100.0%	16.7%	18.2%
症状がひどく生活(登校)に支障があり、自宅で安静(学校休み)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	100.0%	100.0%	-	-	80.0%	-	100.0%	100.0%	-	83.3%	81.8%


### 3. その他

①あなたの同居している家族(保護者など)は、新型コロナウイルスワクチンを接種されましたか。




回答	回答数	回答率
同居している20歳以上の家族全員が接種している	152	94.4%
65歳以上の同居家族は接種しているが、父親と母親は接種していない	0	0%
保護者のうち、父親または母親のどちらかは接種している	9	5.6%
自分以外の家族は接種していない	0	0%
計	161	

②あなたは、ワクチン接種についての情報をどのような方法で知りましたか。あてはまるものすべて選択してください(複数回答可)



回答	回答数	回答率
市からの接種案内文書が届いたから	123	76.4%
保護者から聞いた	107	66%
学校から聞いた	27	16.8%
同級生や友人から聞いた	24	15%
インターネットニュースやSNS	49	30%
計	330	


③あなたがワクチンを接種しようと思ったのはなぜですか。次のうち、あなたの考えに一番近いものを1つ教えてください。



回答	回答数	回答率
新型コロナに感染しにくくなることで、安心して学校生活やプライベートを送れるようになるから	97	60.2%
保護者などから接種するよう勧められたから	42	26.1%
同居する家族の中に高齢者や病人がいるため、自分自身が感染しないことが必要だと思ったから	8	5.0%
はじめは接種する考えは無かったが、周りの同級生や友人も接種すると聞いたから	12	7.5%
その他(※回答内容)	2	1.2%
計	161	

※ アレルギーを持っているので初めは受けるか迷っていたが、アレルギーによる副反応は少ないと聞いたから。  
市から接種の案内が来たから

④あなたはワクチン接種後に起こり得る副反応に関する情報はどこから得ましたか。あてはまるものすべて選択してください(複数回答可)



回答	回答数	回答率
インターネットニュースやSNS	118	34.2%
市のホームページや広報紙	22	6.4%
新聞	14	4.1%
学校	31	9.0%
保護者	111	32.2%
友人	45	13.0%
その他(※回答内容)	4	1.2%
計	345	

※ テレビ、自分