


1. 副反応ごとの発症割合グラフ(下表の年代別男女計の発症割合)




◎接種後における副反応別のアンケート結果(複数回答)

主な副反応の区分	男性						女性						全体の発症割合/数	
	20代	30代	40代	50代	60-70代	計	~20代	30代	40代	50代	60-70代	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(8名)	(10名)	(10名)	(10名)	(12名)	(50名)	(32名)	(31名)	(53名)	(39名)	(18名)	(173名)	(223名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(8名)	(10名)	(10名)	(10名)	(12名)	(50名)	(31名)	(30名)	(53名)	(39名)	(17名)	(170名)	(220名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(10名)	(7名)	(9名)	(9名)	(39名)	(4名)	(9名)	(36名)	(30名)	(23名)	(102名)	(141名)	
(1)接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	1回目接種後	発症割合 88%	80%	70%	60%	50%	68%	84%	90%	77%	79%	78%	82%	78.5%
	2回目接種後	発症者数 7	8	7	6	6	34	27	28	41	31	14	141	175
	3回目接種後	発症割合 75%	90%	86%	78%	56%	77%	75%	100%	86%	87%	83%	86%	83.7%
(2)発熱(37.5℃以上)	1回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	4%	0%	11%	3%	2.7%
	2回目接種後	発症者数 0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	6
	3回目接種後	発症割合 75%	40%	20%	30%	0%	30%	42%	57%	43%	33%	18%	41%	38.2%
(3)発熱(37.5℃未満)	1回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	10%	0%	2%	6%	6%	4%	8%	6%	6%	4.9%
	2回目接種後	発症者数 0	0	0	1	0	1	2	2	2	3	1	10	11
	3回目接種後	発症割合 13%	10%	40%	0%	0%	12%	26%	7%	9%	8%	24%	13%	12.7%
(4)倦怠感(だるさ、疲れなど)	1回目接種後	発症割合 13%	20%	0%	30%	8%	14%	38%	26%	25%	18%	17%	25%	22.4%
	2回目接種後	発症者数 1	2	0	3	1	7	12	8	13	7	3	43	50
	3回目接種後	発症割合 75%	50%	50%	50%	17%	46%	65%	53%	66%	51%	65%	60%	56.8%
(5)関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	1回目接種後	発症割合 100%	50%	71%	44%	11%	49%	75%	67%	53%	37%	52%	50%	49.6%
	2回目接種後	発症者数 4	5	5	4	1	19	3	6	19	11	12	51	70
	3回目接種後	発症割合 13%	10%	20%	10%	0%	10%	16%	16%	11%	15%	22%	15%	13.9%
(6)めまい	1回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	10%	0%	0%	0%	2%	1.8%
	2回目接種後	発症者数 0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	4
	3回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	11%	0%	3%	0%	0%	11%	10%	0%	7%	5.7%
(7)頭痛	1回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	6%	9%	5%	0%	6%	4.5%
	2回目接種後	発症者数 0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	10	10
	3回目接種後	発症割合 13%	0%	20%	0%	0%	6%	6%	17%	13%	13%	12%	12%	10.9%
(8)その他(悪寒、吐き気、下痢、腹痛、リンパの痛み、のどの痛みなど)	1回目接種後	発症割合 25%	10%	0%	0%	0%	5%	25%	22%	22%	27%	4%	20%	15.6%
	2回目接種後	発症者数 1	1	0	0	0	2	1	2	8	8	1	20	22
	3回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(9)特に何もなかった	1回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	2回目接種後	発症者数 0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
	3回目接種後	発症割合 0%	0%	0%	0%	33%	8%	0%	0%	3%	3%	13%	5%	5.7%

2. 接種後の副反応ごとの状況について

(1) 接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	接種後	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
		~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数		(7名)	(8名)	(7名)	(6名)	(6名)	(34名)	(27名)	(28名)	(41名)	(31名)	(14名)	(141名)	(175名)
2回目接種後の年代別回答者数		(7名)	(6名)	(5名)	(4名)	(7名)	(29名)	(21名)	(20名)	(32名)	(27名)	(13名)	(113名)	(142名)
3回目接種後の年代別回答者数		(3名)	(9名)	(6名)	(7名)	(5名)	(30名)	(3名)	(9名)	(31名)	(26名)	(19名)	(88名)	(118名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	16.7%	-	2.9%	-	-	-	-	-	-	0.6%
	2回目接種後	-	-	-	-	14.3%	3.4%	-	-	3.1%	7.4%	-	2.7%	2.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	42.9%	25.0%	57.1%	33.3%	33.3%	38.2%	29.6%	25.0%	24.4%	32.3%	28.6%	27.7%	29.7%
	2回目接種後	28.6%	16.7%	40.0%	25.0%	57.1%	34.5%	42.9%	40.0%	28.1%	25.9%	23.1%	31.9%	32.4%
	3回目接種後	-	33.3%	33.3%	42.9%	20.0%	30.0%	-	11.1%	6.5%	19.2%	15.8%	12.5%	16.9%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	28.6%	50.0%	42.9%	16.7%	66.7%	41.2%	51.9%	50.0%	48.8%	41.9%	50.0%	48.2%	46.9%
	2回目接種後	42.9%	50.0%	40.0%	50.0%	28.6%	41.4%	42.9%	40.0%	46.9%	40.7%	53.8%	44.2%	43.7%
	3回目接種後	66.7%	55.6%	66.7%	57.1%	60.0%	60.0%	33.3%	11.1%	58.1%	46.2%	42.1%	45.5%	49.2%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	28.6%	-	-	16.7%	-	8.8%	7.4%	-	2.4%	3.2%	7.1%	3.5%	4.6%
	2回目接種後	14.3%	-	20.0%	25.0%	-	10.3%	4.8%	5.0%	6.3%	-	7.7%	4.4%	5.6%
	3回目接種後	-	11.1%	-	-	-	3.3%	-	11.1%	3.2%	-	-	2.3%	2.5%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	25.0%	-	16.7%	-	8.8%	11.1%	25.0%	19.5%	9.7%	14.3%	16.3%	14.9%
	2回目接種後	-	33.3%	-	-	-	6.9%	9.5%	15.0%	9.4%	11.1%	7.7%	10.6%	9.9%
	3回目接種後	-	-	-	-	20.0%	3.3%	33.3%	44.4%	29.0%	23.1%	31.6%	29.5%	22.9%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9%	12.9%	-	4.3%	3.4%
	2回目接種後	14.3%	-	-	-	-	3.4%	-	-	6.3%	14.8%	7.7%	6.2%	5.6%
	3回目接種後	33.3%	-	-	-	-	3.3%	33.3%	22.2%	3.2%	11.5%	10.5%	10.2%	8.5%


②ピークはいつだったか。	接種後	男性						女性						男女計
		~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
接種当日	1回目接種後	-	12.5%	-	16.7%	16.7%	8.8%	3.7%	17.9%	7.3%	22.6%	14.3%	12.8%	12.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	14.3%	3.4%	9.5%	5.0%	6.3%	18.5%	7.7%	9.7%	8.5%
	3回目接種後	33.3%	-	-	14.3%	20.0%	10.0%	-	11.1%	12.9%	11.5%	15.8%	12.5%	11.9%
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	87.5%	100.0%	83.3%	83.3%	91.2%	96.3%	82.1%	82.9%	71.0%	85.7%	83.0%	84.6%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	85.7%	93.1%	81.0%	85.0%	75.0%	70.4%	61.5%	75.2%	78.9%
	3回目接種後	66.7%	88.9%	83.3%	85.7%	80.0%	83.3%	66.7%	77.8%	83.9%	80.8%	68.4%	78.4%	79.7%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8%	3.2%	-	3.5%	2.9%
	2回目接種後	-	-	-	25.0%	-	3.4%	9.5%	10.0%	18.8%	7.4%	23.1%	13.3%	11.3%
	3回目接種後	-	11.1%	-	-	-	3.3%	33.3%	11.1%	3.2%	7.7%	15.8%	9.1%	7.6%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2%	-	0.7%	0.6%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7%	7.7%	1.8%	1.4%
	3回目接種後	-	-	16.7%	-	-	3.3%	-	-	-	-	-	-	0.8%

③病院を受診したか。	接種後	男性						女性						男女計
		~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	3.6%	-	-	-	0.7%	0.6%
	2回目接種後	-	-	-	-	14.3%	3.4%	-	5.0%	3.1%	-	-	1.8%	2.1%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.4%	100.0%	100.0%	100.0%	99.3%	99.4%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	96.6%	100.0%	95.0%	96.9%	100.0%	100.0%	98.2%	97.9%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	接種後	男性						女性						男女計
		~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	88.9%	92.9%	97.6%	100.0%	92.9%	95.0%	96.0%
	2回目接種後	85.7%	83.3%	80.0%	100.0%	100.0%	89.7%	90.5%	90.0%	87.5%	92.6%	84.6%	89.4%	89.4%
	3回目接種後	66.7%	88.9%	83.3%	100.0%	100.0%	90.0%	100.0%	66.7%	83.9%	84.6%	89.5%	84.1%	85.6%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	11.1%	7.1%	2.4%	-	7.1%	5.0%	4.0%
	2回目接種後	14.3%	16.7%	20.0%	-	-	10.3%	9.5%	10.0%	12.5%	7.4%	15.4%	10.6%	10.6%
	3回目接種後	33.3%	11.1%	16.7%	-	-	10.0%	-	33.3%	16.1%	15.4%	10.5%	15.9%	14.4%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	接種後	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
		~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
2回目よりも症状が重かったと思う		(2名)	(7名)	(4名)	(6名)	(3名)	(22名)	(3名)	(7名)	(23名)	(23名)	(16名)	(72名)	(94名)
2回目よりも症状が軽かったと思う		-	14.3%	25.0%	33.3%	66.7%	27.3%	33.3%	42.9%	39.1%	26.1%	37.5%	34.7%	33.0%
2回目と同じ程度だったと思う		50.0%	28.6%	-	-	33.3%	18.2%	66.7%	28.6%	39.1%	34.8%	25.0%	34.7%	30.9%
2回目と同じ程度だったと思う		50.0%	57.1%	75.0%	66.7%	-	54.5%	-	28.6%	21.7%	39.1%	37.5%	30.6%	36.2%

(2) 発熱(37.5℃以上)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃以上)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(2名)	(0名)	(2名)	(0名)	(2名)	(6名)	(6名)
2回目接種後の年代別回答者数	(6名)	(4名)	(2名)	(3名)	(0名)	(15名)	(13名)	(17名)	(23名)	(13名)	(3名)	(69名)	(84名)
3回目接種後の年代別回答者数	(3名)	(3名)	(1名)	(2名)	(0名)	(9名)	(0名)	(5名)	(8名)	(6名)	(4名)	(23名)	(32名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	50.0%	-	50.0%	-	-	33.3%	33.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	5.9%	4.3%	-	-	2.9%	2.4%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	4.3%	3.1%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	50.0%	-	50.0%	-	50.0%	50.0%	50.0%
	2回目接種後	33.3%	-	50.0%	33.3%	26.7%	15.4%	17.6%	17.4%	23.1%	33.3%	18.8%	20.2%
	3回目接種後	33.3%	66.7%	-	-	33.3%	-	40.0%	37.5%	16.7%	-	26.1%	28.1%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	50.0%	-	50.0%	-	26.7%	23.1%	23.5%	17.4%	15.4%	33.3%	20.3%	21.4%
	3回目接種後	33.3%	-	-	-	11.1%	-	40.0%	12.5%	33.3%	25.0%	26.1%	21.9%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	16.7%	100.0%	-	33.3%	40.0%	46.2%	41.2%	43.5%	38.5%	33.3%	42.0%	41.7%
	3回目接種後	33.3%	33.3%	100.0%	50.0%	44.4%	-	-	37.5%	33.3%	50.0%	30.4%	34.4%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	33.3%	6.7%	7.7%	11.8%	17.4%	23.1%	-	14.5%	13.1%
	3回目接種後	-	-	-	50.0%	11.1%	-	-	12.5%	16.7%	25.0%	13.0%	12.5%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	16.7%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	7.7%	-	-	-	-	1.4%	1.2%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	50.0%	-	50.0%	-	-	33.3%	33.3%
	2回目接種後	-	-	50.0%	-	6.7%	-	5.9%	8.7%	7.7%	-	5.8%	6.0%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	4.3%	3.1%
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	-	-	50.0%	-	50.0%	-	50.0%	50.0%	50.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	93.3%	92.3%	94.1%	91.3%	84.6%	100.0%	91.3%	91.7%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	80.0%	87.5%	100.0%	75.0%	87.0%	90.6%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	7.7%	-	-	7.7%	-	2.9%	2.4%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	25.0%	8.7%	6.3%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	16.7%	16.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	16.7%	25.0%	-	-	13.3%	7.7%	11.8%	13.0%	-	-	8.7%	9.5%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	83.3%	75.0%	100.0%	100.0%	86.7%	92.3%	88.2%	87.0%	100.0%	100.0%	91.3%	90.5%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	50.0%	50.0%	50.0%
	2回目接種後	66.7%	25.0%	50.0%	33.3%	46.7%	23.1%	29.4%	47.8%	46.2%	66.7%	39.1%	40.5%
	3回目接種後	-	33.3%	-	-	11.1%	-	20.0%	-	33.3%	75.0%	26.1%	21.9%
高熱により、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	50.0%	50.0%	50.0%
	2回目接種後	33.3%	75.0%	50.0%	66.7%	53.3%	76.9%	70.6%	52.2%	53.8%	33.3%	60.9%	59.5%
	3回目接種後	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	88.9%	-	80.0%	100.0%	66.7%	25.0%	73.9%	78.1%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
2回目より症状が重かったと思う	(2名)	(2名)	(1名)	(1名)	(0名)	(6名)	(0名)	(5名)	(6名)	(4名)	(3名)	(18名)	(24名)
2回目より症状が軽かったと思う	50.0%	-	-	-	-	16.7%	-	40.0%	33.3%	75.0%	-	38.9%	33.3%
2回目と同じ程度だったと思う	-	-	-	100.0%	-	16.7%	-	60.0%	33.3%	-	-	27.8%	25.0%
2回目より症状が重かったと思う	50.0%	100.0%	100.0%	-	-	66.7%	-	-	33.3%	25.0%	100.0%	33.3%	41.7%

(3) 発熱(37.5℃未満)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



(3) 発熱(37.5℃未満)

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(1名)	(2名)	(2名)	(2名)	(3名)	(1名)	(10名)	(11名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(1名)	(4名)	(0名)	(0名)	(6名)	(8名)	(2名)	(5名)	(3名)	(4名)	(22名)	(28名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(2名)	(3名)	(1名)	(0名)	(7名)	(2名)	(3名)	(7名)	(1名)	(2名)	(15名)	(22名)	
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	10.0%	9.1%	
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	9.1%	7.1%	
	3回目接種後	-	50.0%	-	-	-	14.3%	-	-	-	-	-	4.5%	
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	33.3%	-	50.0%	54.5%
	2回目接種後	-	100.0%	25.0%	-	-	33.3%	62.5%	100.0%	60.0%	-	25.0%	50.0%	46.4%
	3回目接種後	-	-	66.7%	100.0%	-	42.9%	-	33.3%	57.1%	-	100.0%	46.7%	45.5%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7%	100.0%	30.0%	27.3%	
	2回目接種後	-	-	25.0%	-	-	16.7%	-	-	-	33.3%	-	4.5%	7.1%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	6.7%	4.5%	
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	10.0%	9.1%	
	2回目接種後	100.0%	-	50.0%	-	-	50.0%	12.5%	-	40.0%	66.7%	25.0%	27.3%	32.1%
	3回目接種後	-	50.0%	33.3%	-	-	28.6%	100.0%	66.7%	42.9%	-	-	46.7%	40.9%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	9.1%	7.1%
	3回目接種後	100.0%	-	-	-	-	14.3%	-	-	-	-	-	4.5%	


②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	50.0%	50.0%	-	-	-	20.0%	18.2%
	2回目接種後	-	100.0%	-	-	-	16.7%	-	-	-	-	50.0%	9.1%	10.7%
	3回目接種後	-	50.0%	-	-	-	14.3%	-	-	14.3%	-	-	6.7%	9.1%
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	66.7%	100.0%	70.0%	72.7%
	2回目接種後	100.0%	-	100.0%	-	-	83.3%	87.5%	100.0%	100.0%	66.7%	50.0%	81.8%	82.1%
	3回目接種後	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	-	85.7%	100.0%	100.0%	85.7%	-	100.0%	86.7%	86.4%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	10.0%	9.1%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	-	33.3%	-	9.1%	7.1%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	6.7%	4.5%

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	10.0%	9.1%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	9.1%	7.1%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	90.0%	90.9%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	100.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.9%	92.9%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	33.3%	100.0%	60.0%	63.6%
	2回目接種後	-	100.0%	75.0%	-	-	66.7%	75.0%	100.0%	80.0%	33.3%	75.0%	72.7%	71.4%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	-	85.7%	100.0%	66.7%	57.1%	100.0%	50.0%	66.7%	72.7%
発熱により、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	50.0%	66.7%	-	40.0%	36.4%
	2回目接種後	100.0%	-	25.0%	-	-	33.3%	25.0%	-	20.0%	66.7%	25.0%	27.3%	28.6%
	3回目接種後	-	-	33.3%	-	-	14.3%	-	33.3%	42.9%	-	50.0%	33.3%	27.3%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
	(0名)	(1名)	(1名)	(1名)	(0名)	(3名)	(1名)	(1名)	(1名)	(1名)	(1名)	(5名)	(8名)
2回目よりも症状が重かったと思う	-	-	-	100.0%	-	33.3%	-	-	-	-	-	-	12.5%
2回目よりも症状が軽かったと思う	-	100.0%	100.0%	-	-	66.7%	100.0%	100.0%	-	-	-	40.0%	50.0%
2回目と同じ程度だったと思う	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	60.0%	37.5%

(4) 倦怠感(だるさ、疲れなど)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎倦怠感(だるさ、疲れなど)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(2名)	(0名)	(3名)	(1名)	(7名)	(12名)	(8名)	(13名)	(7名)	(3名)	(43名)	(50名)
2回目接種後の年代別回答者数	(6名)	(5名)	(5名)	(5名)	(2名)	(23名)	(20名)	(16名)	(35名)	(20名)	(11名)	(102名)	(125名)
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(5名)	(5名)	(4名)	(1名)	(19名)	(3名)	(6名)	(19名)	(11名)	(12名)	(51名)	(70名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	100.0%	14.3%	-	-	-	-	-	-	2.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0%	-	1.0%	0.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	100.0%	50.0%	-	66.7%	57.1%	41.7%	25.0%	38.5%	-	-	27.9%	32.0%
	2回目接種後	33.3%	20.0%	20.0%	20.0%	-	21.7%	35.0%	12.5%	17.1%	10.0%	19.6%	20.0%
	3回目接種後	25.0%	40.0%	40.0%	50.0%	-	36.8%	66.7%	-	31.6%	27.3%	25.0%	27.5%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	50.0%	-	-	14.3%	41.7%	25.0%	38.5%	57.1%	66.7%	41.9%	38.0%
	2回目接種後	33.3%	60.0%	40.0%	20.0%	50.0%	39.1%	35.0%	43.8%	31.4%	40.0%	27.3%	35.3%
	3回目接種後	50.0%	40.0%	20.0%	25.0%	100.0%	36.8%	-	66.7%	21.1%	-	33.3%	23.5%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	20.0%	40.0%	40.0%	-	21.7%	10.0%	6.3%	28.6%	20.0%	36.4%	20.8%
	3回目接種後	-	20.0%	20.0%	-	-	10.5%	33.3%	16.7%	10.5%	-	8.3%	9.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	33.3%	14.3%	16.7%	37.5%	23.1%	28.6%	33.3%	25.6%	24.0%
	2回目接種後	-	-	-	20.0%	50.0%	8.7%	20.0%	31.3%	17.1%	15.0%	17.6%	16.0%
	3回目接種後	25.0%	-	-	25.0%	-	10.5%	-	16.7%	36.8%	63.6%	33.3%	37.3%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	14.3%	-	4.7%	4.0%
	2回目接種後	33.3%	-	-	-	8.7%	-	6.3%	5.7%	10.0%	9.1%	5.9%	6.4%
	3回目接種後	-	-	20.0%	-	-	5.3%	-	-	9.1%	-	2.0%	2.9%


②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	33.3%	100.0%	28.6%	-	-	7.7%	-	-	2.3%	6.0%
	2回目接種後	-	20.0%	-	-	-	4.3%	10.0%	-	2.9%	5.0%	-	3.9%	4.0%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3%	2.0%	1.4%
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	100.0%	-	33.3%	57.1%	91.7%	62.5%	84.6%	71.4%	100.0%	81.4%	78.0%	
	2回目接種後	100.0%	80.0%	100.0%	100.0%	50.0%	91.3%	75.0%	77.1%	80.0%	90.9%	78.4%	80.8%	
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	78.9%	90.9%	83.3%	82.4%	
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	33.3%	14.3%	8.3%	37.5%	7.7%	28.6%	-	16.3%	16.0%	
	2回目接種後	-	-	-	-	50.0%	4.3%	15.0%	25.0%	20.0%	15.0%	9.1%	15.2%	
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	21.1%	9.1%	8.3%	11.4%	

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	16.7%	-	-	-	-	4.3%	5.0%	6.3%	8.6%	-	4.9%	4.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	16.7%	-	-	-	2.0%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.7%	95.0%	93.8%	91.4%	100.0%	95.1%	95.2%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	83.3%	75.0%	92.3%	71.4%	66.7%	81.4%
	2回目接種後	50.0%	60.0%	60.0%	40.0%	100.0%	56.5%	50.0%	56.3%	57.1%	75.0%	54.5%	58.8%
	3回目接種後	50.0%	60.0%	80.0%	50.0%	100.0%	63.2%	66.7%	50.0%	52.6%	45.5%	75.0%	56.9%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	16.7%	25.0%	7.7%	28.6%	33.3%	18.6%
	2回目接種後	50.0%	40.0%	40.0%	60.0%	-	43.5%	50.0%	43.8%	42.9%	25.0%	45.5%	41.2%
	3回目接種後	50.0%	40.0%	20.0%	50.0%	-	36.8%	33.3%	50.0%	47.4%	54.5%	25.0%	43.1%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
2回目よりも症状が重かったと思う	(3名)	(4名)	(4名)	(2名)	(1名)	(14名)	(3名)	(6名)	(16名)	(11名)	(11名)	(47名)	(61名)
2回目よりも症状が軽かったと思う	33.3%	-	25.0%	50.0%	-	21.4%	33.3%	33.3%	31.3%	63.6%	36.4%	40.4%	36.1%
2回目と同じ程度だったと思う	-	-	50.0%	50.0%	-	21.4%	66.7%	50.0%	37.5%	9.1%	9.1%	27.7%	26.2%
2回目と同じ程度だったと思う	66.7%	100.0%	25.0%	-	100.0%	57.1%	-	16.7%	31.3%	27.3%	54.5%	31.9%	37.7%

(5)関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(1名)	(2名)	(1名)	(0名)	(5名)	(5名)	(5名)	(6名)	(6名)	(4名)	(26名)	(31名)
2回目接種後の年代別回答者数	(5名)	(2名)	(3名)	(2名)	(1名)	(13名)	(15名)	(9名)	(18名)	(11名)	(5名)	(58名)	(71名)
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(4名)	(3名)	(4名)	(0名)	(15名)	(3名)	(6名)	(12名)	(9名)	(8名)	(38名)	(53名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	3.8%	3.2%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	100.0%	-	50.0%	-	40.0%	20.0%	40.0%	-	33.3%	50.0%	26.9%	29.0%
	2回目接種後	60.0%	-	66.7%	-	38.5%	46.7%	11.1%	11.1%	27.3%	-	22.4%	25.4%
	3回目接種後	50.0%	25.0%	33.3%	50.0%	40.0%	33.3%	16.7%	33.3%	11.1%	12.5%	21.1%	26.4%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	100.0%	-	-	20.0%	40.0%	20.0%	50.0%	33.3%	25.0%	34.6%	32.3%
	2回目接種後	40.0%	100.0%	-	-	30.8%	13.3%	55.6%	22.2%	18.2%	80.0%	29.3%	29.6%
	3回目接種後	25.0%	25.0%	-	50.0%	26.7%	-	66.7%	33.3%	33.3%	50.0%	39.5%	35.8%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	7.7%	6.5%
	2回目接種後	-	-	33.3%	100.0%	100.0%	30.8%	26.7%	-	38.9%	27.3%	20.0%	25.9%
	3回目接種後	-	50.0%	33.3%	-	20.0%	33.3%	16.7%	8.3%	11.1%	-	10.5%	13.2%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	50.0%	100.0%	40.0%	20.0%	20.0%	16.7%	33.3%	-	19.2%	22.6%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	13.3%	11.1%	27.8%	27.3%	-	19.0%	15.5%
	3回目接種後	25.0%	-	-	-	6.7%	33.3%	-	25.0%	44.4%	25.0%	26.3%	20.8%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	25.0%	7.7%	6.5%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	22.2%	-	-	-	3.4%	2.8%
	3回目接種後	-	-	33.3%	-	6.7%	-	-	-	-	12.5%	2.6%	3.8%




②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	60.0%	20.0%	-	16.7%	-	19.2%	16.1%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目接種後	-	-	-	25.0%	-	6.7%	-	-	-	11.1%	-	2.6%
接種日の翌日	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	-	80.0%	40.0%	60.0%	83.3%	66.7%	75.0%	65.4%	67.7%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	93.3%	55.6%	94.4%	81.8%	80.0%	84.5%	87.3%
	3回目接種後	75.0%	100.0%	100.0%	75.0%	-	86.7%	100.0%	66.7%	83.3%	77.8%	87.5%	81.6%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	100.0%	20.0%	-	20.0%	16.7%	16.7%	25.0%	15.4%	16.1%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	6.7%	33.3%	5.6%	18.2%	20.0%	13.8%	11.3%
	3回目接種後	25.0%	-	-	-	6.7%	-	33.3%	16.7%	11.1%	12.5%	15.8%	13.2%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	11.1%	-	-	-	1.7%	1.4%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	11.1%	-	-	3.4%	2.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	16.7%	-	-	2.6%	1.9%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	88.9%	100.0%	96.6%	97.2%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	83.3%	100.0%	100.0%	97.4%	98.1%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	60.0%	100.0%	100.0%	75.0%	88.5%
	2回目接種後	60.0%	100.0%	66.7%	50.0%	100.0%	69.2%	60.0%	77.8%	50.0%	81.8%	60.0%	63.8%
	3回目接種後	50.0%	50.0%	66.7%	75.0%	-	60.0%	33.3%	50.0%	41.7%	55.6%	62.5%	50.0%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	25.0%	11.5%	9.7%
	2回目接種後	40.0%	-	33.3%	50.0%	-	30.8%	40.0%	22.2%	50.0%	18.2%	40.0%	36.2%
	3回目接種後	50.0%	50.0%	33.3%	25.0%	-	40.0%	66.7%	50.0%	58.3%	44.4%	37.5%	50.0%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
	(3名)	(2名)	(1名)	(4名)	(0名)	(10名)	(3名)	(5名)	(7名)	(5名)	(6名)	(26名)	(36名)
2回目よりも症状が重かったと思う	33.3%	-	-	50.0%	-	30.0%	33.3%	40.0%	57.1%	80.0%	50.0%	53.8%	47.2%
2回目よりも症状が軽かったと思う	-	-	-	25.0%	-	10.0%	66.7%	40.0%	14.3%	20.0%	-	23.1%	19.4%
2回目と同じ程度だったと思う	66.7%	100.0%	100.0%	25.0%	-	60.0%	-	20.0%	28.6%	-	50.0%	23.1%	33.3%

(6) めまいの発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎めまいの症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(3名)	(0名)	(0名)	(0名)	(4名)	(4名)
2回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(5名)	(4名)	(2名)	(0名)	(2名)	(13名)	(13名)
3回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(4名)	(3名)	(0名)	(7名)	(8名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	-	25.0%	25.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	50.0%	15.4%	15.4%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	14.3%	12.5%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	33.3%	-	-	-	50.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	60.0%	25.0%	-	-	-	30.8%	30.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	14.3%	12.5%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	7.7%	7.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	14.3%	12.5%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	20.0%	-	100.0%	-	-	23.1%	23.1%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	14.3%	12.5%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	20.0%	25.0%	-	-	-	15.4%	15.4%
	3回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	-	-	50.0%	33.3%	-	42.9%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	-	25.0%	25.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	7.7%	7.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	66.7%	-	-	-	50.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	100.0%	23.1%	23.1%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	14.3%	12.5%
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	25.0%	25.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	80.0%	25.0%	100.0%	-	-	53.8%	53.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	100.0%	-	57.1%	50.0%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	20.0%	25.0%	-	-	-	15.4%	15.4%
	3回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	-	-	50.0%	-	-	28.6%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	-	25.0%	25.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	7.7%	7.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	-	25.0%	25.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	7.7%	7.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	66.7%	-	-	-	75.0%	75.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	50.0%	-	100.0%	92.3%	92.3%
	3回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	-	-	100.0%	100.0%	-	100.0%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	66.7%	-	-	-	50.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	60.0%	100.0%	-	-	100.0%	69.2%	69.2%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	66.7%	-	57.1%	50.0%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	33.3%	-	-	-	50.0%	50.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	40.0%	-	100.0%	-	-	30.8%	30.8%
	3回目接種後	-	-	-	100.0%	-	100.0%	-	-	50.0%	33.3%	-	42.9%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(1名)	(1名)
2回目よりも症状が重かったと思う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2回目よりも症状が軽かったと思う	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	100.0%	100.0%
2回目と同じ程度だったと思う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 頭痛の発症割合グラフ(下表①②⑤の男女計)



◎頭痛の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(5名)	(7名)	(5名)	(8名)	(4名)	(29名)	(30名)
2回目接種後の年代別回答者数	(6名)	(3名)	(3名)	(1名)	(1名)	(14名)	(12名)	(14名)	(25名)	(13名)	(7名)	(71名)	(85名)
3回目接種後の年代別回答者数	(3名)	(2名)	(3名)	(4名)	(0名)	(12名)	(2名)	(8名)	(17名)	(10名)	(8名)	(45名)	(57名)
接種日のみ	1回目接種後	100.0%	-	-	-	100.0%	-	14.3%	20.0%	-	-	6.9%	10.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	100.0%	7.1%	-	-	4.0%	7.7%	-	2.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	4.4%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	40.0%	28.6%	20.0%	37.5%	25.0%	31.0%	30.0%
	2回目接種後	50.0%	33.3%	66.7%	-	-	42.9%	41.7%	14.3%	20.0%	-	28.6%	19.7%
	3回目接種後	33.3%	-	33.3%	25.0%	-	25.0%	50.0%	-	35.3%	30.0%	12.5%	24.4%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	60.0%	14.3%	20.0%	12.5%	50.0%	27.6%
	2回目接種後	33.3%	-	-	-	-	14.3%	8.3%	50.0%	28.0%	38.5%	28.6%	31.0%
	3回目接種後	33.3%	-	33.3%	50.0%	-	33.3%	-	37.5%	17.6%	30.0%	50.0%	28.9%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	-	12.5%	-	6.9%
	2回目接種後	-	66.7%	33.3%	100.0%	-	28.6%	25.0%	14.3%	24.0%	7.7%	28.6%	19.7%
	3回目接種後	-	100.0%	33.3%	-	-	25.0%	-	12.5%	17.6%	20.0%	-	13.3%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	20.0%	25.0%	25.0%	17.2%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	8.3%	14.3%	12.0%	46.2%	14.3%	18.3%
	3回目接種後	33.3%	-	-	-	-	8.3%	50.0%	25.0%	23.5%	20.0%	37.5%	26.7%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	20.0%	12.5%	-	10.3%
	2回目接種後	16.7%	-	-	-	-	7.1%	16.7%	7.1%	12.0%	-	-	8.5%
	3回目接種後	-	-	-	25.0%	-	8.3%	-	-	5.9%	-	-	2.2%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
接種当日	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	-	-	20.0%	25.0%	-	10.3%
	2回目接種後	-	-	-	-	100.0%	7.1%	-	7.1%	8.0%	7.7%	-	5.6%
	3回目接種後	-	-	-	25.0%	-	8.3%	-	25.0%	5.9%	-	12.5%	8.9%
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	80.0%	85.7%	60.0%	37.5%	75.0%	65.5%
	2回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	92.9%	75.0%	85.7%	72.0%	76.9%	71.4%	76.1%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	-	83.3%	100.0%	62.5%	70.6%	80.0%	75.0%	73.3%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	20.0%	37.5%	25.0%	20.7%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	7.1%	12.0%	15.4%	28.6%	15.5%
	3回目接種後	-	-	-	25.0%	-	8.3%	-	12.5%	17.6%	20.0%	12.5%	15.6%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	-	-	-	3.4%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0%	-	-	2.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9%	-	-	2.2%

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	16.7%	-	-	-	-	7.1%	-	-	8.0%	-	-	2.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	-	-	2.2%
受診しなかった	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2回目接種後	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	92.9%	100.0%	100.0%	92.0%	100.0%	100.0%	97.2%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	97.8%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100.0%	-	-	-	-	100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	75.0%	75.0%	86.2%
	2回目接種後	83.3%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	85.7%	75.0%	57.1%	48.0%	53.8%	57.1%	56.3%
	3回目接種後	33.3%	50.0%	100.0%	75.0%	-	66.7%	-	62.5%	58.8%	50.0%	75.0%	57.8%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	14.3%	-	25.0%	25.0%	13.8%
	2回目接種後	16.7%	-	33.3%	-	-	14.3%	25.0%	42.9%	52.0%	46.2%	42.9%	43.7%
	3回目接種後	66.7%	50.0%	-	25.0%	-	33.3%	100.0%	37.5%	41.2%	50.0%	25.0%	42.2%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
	(3名)	(2名)	(2名)	(0名)	(0名)	(7名)	(2名)	(8名)	(11名)	(6名)	(5名)	(32名)	(39名)
2回目よりも症状が重かったと思う	66.7%	-	50.0%	-	-	42.9%	100.0%	12.5%	36.4%	16.7%	40.0%	31.3%	33.3%
2回目よりも症状が軽かったと思う	-	50.0%	50.0%	-	-	28.6%	-	62.5%	18.2%	-	20.0%	25.0%	25.6%
2回目と同じ程度だったと思う	33.3%	50.0%	-	-	-	28.6%	-	25.0%	45.5%	83.3%	40.0%	43.8%	41.0%

(8) その他(悪寒、吐き気、下痢、腹痛、リンパの痛み、のどの痛みなど)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(2名)	(5名)	(2名)	(0名)	(10名)	(10名)
2回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(0名)	(2名)	(0名)	(0名)	(3名)	(2名)	(5名)	(7名)	(5名)	(2名)	(21名)	(24名)
3回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(2名)	(1名)	(2名)	(8名)	(8名)	(1名)	(20名)	(22名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	100.0%	50.0%	40.0%	-	-	40.0%	40.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	12.5%	-	10.0%	9.1%
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	10.0%	10.0%
	2回目接種後	-	-	50.0%	-	-	33.3%	-	20.0%	14.3%	20.0%	14.3%	16.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	-	-	12.5%	-	10.0%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	50.0%	-	30.0%	30.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	28.6%	20.0%	50.0%	19.0%	16.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	37.5%	25.0%	-	30.0%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	10.0%	10.0%
	2回目接種後	-	-	50.0%	-	-	33.3%	-	-	28.6%	40.0%	50.0%	23.8%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	-	-	-	100.0%	-	-	12.5%	-	-	5.0%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	40.0%	-	-	19.0%	16.7%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	12.5%	12.5%	100.0%	20.0%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	10.0%	10.0%
	2回目接種後	100.0%	-	-	-	-	33.3%	-	40.0%	28.6%	20.0%	-	23.8%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	37.5%	-	25.0%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	50.0%	40.0%	-	-	40.0%	40.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	14.3%	20.0%	-	14.3%	
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	25.0%	-	15.0%	
接種日の翌日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0%	100.0%	-	50.0%	
	2回目接種後	100.0%	-	100.0%	-	-	100.0%	100.0%	20.0%	42.9%	80.0%	50.0%	52.4%	
	3回目接種後	100.0%	100.0%	-	-	-	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	12.5%	100.0%	40.0%	
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	14.3%	-	50.0%	14.3%	
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	37.5%	50.0%	-	40.0%	
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	10.0%	
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	28.6%	-	-	19.0%	
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	5.0%	

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	10.0%
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	28.6%	-	-	14.3%
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	5.0%
受診しなかった	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	-	90.0%
	2回目接種後	100.0%	-	100.0%	-	-	100.0%	100.0%	80.0%	71.4%	100.0%	100.0%	85.7%
	3回目接種後	100.0%	100.0%	-	-	-	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.0%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100.0%	50.0%	100.0%	50.0%	-	80.0%
	2回目接種後	100.0%	-	50.0%	-	-	66.7%	50.0%	40.0%	71.4%	40.0%	50.0%	52.4%
	3回目接種後	-	100.0%	-	-	-	50.0%	-	50.0%	62.5%	75.0%	100.0%	65.0%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	50.0%	-	20.0%
	2回目接種後	-	-	50.0%	-	-	33.3%	50.0%	60.0%	28.6%	60.0%	50.0%	47.6%
	3回目接種後	100.0%	-	-	-	-	50.0%	100.0%	50.0%	37.5%	25.0%	-	35.0%

⑤2回目接種後の同じ副反応症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後に同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(1名)	(3名)	(0名)	(1名)	(5名)	(6名)
2回目よりも症状が重かったと思う	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	33.3%	-	100.0%	60.0%	50.0%
2回目よりも症状が軽かったと思う	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	20.0%	16.7%
2回目と同じ程度だったと思う	-	100.0%	-	-	-	100.0%	-	-	33.3%	-	-	20.0%	33.3%