


【相馬市】医療従事者・市職員における新型コロナワクチン3回目接種後の副反応発症状況(R4.2.15現在)

1. 副反応ごとの発症割合グラフ(下表の「男女全体の発症割合/数」の率)





※P・M ■P：3回目接種のうち、ファイザー社製ワクチン接種者312名(3回すべてファイザー)の副反応発症割合(全年代の合計値)
 ■M：3回目接種のうち、モデルナ社製ワクチン接種者147名(交差接種1,2回目ファイザー、3回目モデルナ)の副反応発症割合(全年代の合計値)

◎接種後における副反応別のアンケート結果(複数回答)

主な副反応の区分	男性						女性						男女全体の発症割合/数	ワクチン別発症割合/数		
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		ファイザー(P)	モデルナ(M)	
1回目接種後の年代別回答者数		(37名)	(73名)	(59名)	(52名)	(19名)	(240名)	(45名)	(52名)	(86名)	(47名)	(18名)	(248名)	(488名)	—	—
2回目接種後の年代別回答者数		(37名)	(73名)	(56名)	(47名)	(18名)	(231名)	(43名)	(50名)	(86名)	(47名)	(17名)	(243名)	(474名)	—	—
3回目接種後の年代別回答者数		(26名)	(77名)	(57名)	(52名)	(20名)	(232名)	(33名)	(37名)	(74名)	(50名)	(33名)	(227名)	(459名)	(312名)	(147名)
(1)接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	1回目接種後	発症割合 86%	89%	90%	79%	68%	85%	87%	90%	83%	83%	78%	85%	85%	—	—
		発症者数 32	65	53	41	13	204	39	47	71	39	14	210	414	—	—
	2回目接種後	発症割合 76%	79%	86%	57%	72%	75%	74%	76%	67%	68%	76%	71%	73%	—	—
	発症者数 28	58	48	27	13	174	32	38	58	32	13	173	347	—	—	
	3回目接種後	発症割合 85%	91%	86%	83%	75%	86%	85%	92%	86%	88%	79%	86%	86%	85%	89%
	発症者数 22	70	49	43	15	199	28	34	64	44	26	196	395	264	131	
(2)発熱(37.5°C以上)	1回目接種後	発症割合 3%	1%	2%	2%	0%	2%	7%	2%	2%	0%	11%	3%	2%	—	—
		発症者数 1	1	1	1	0	4	3	1	2	0	2	8	12	—	—
	2回目接種後	発症割合 68%	41%	30%	23%	6%	36%	51%	60%	47%	34%	18%	46%	41%	—	—
	発症者数 25	30	17	11	1	84	22	30	40	16	3	111	195	—	—	
	3回目接種後	発症割合 69%	53%	51%	37%	10%	47%	33%	65%	28%	30%	24%	35%	41%	32%	61%
	発症者数 18	41	29	19	2	109	11	24	21	15	8	79	188	99	89	
(3)発熱(37.5°C未満)	1回目接種後	発症割合 0%	5%	0%	4%	5%	3%	11%	8%	6%	6%	6%	7%	5%	—	—
		発症者数 0	4	0	2	1	7	5	4	5	3	1	18	25	—	—
	2回目接種後	発症割合 11%	22%	25%	26%	11%	21%	21%	8%	14%	11%	24%	14%	17%	—	—
	発症者数 4	16	14	12	2	48	9	4	12	5	4	34	82	—	—	
	3回目接種後	発症割合 15%	18%	25%	19%	20%	20%	33%	14%	26%	12%	6%	19%	19%	21%	16%
	発症者数 4	14	14	10	4	46	11	5	19	6	2	43	89	66	23	
(4)倦怠感(だるさ、疲れなど)	1回目接種後	発症割合 24%	18%	8%	17%	11%	16%	36%	29%	20%	15%	17%	23%	20%	—	—
		発症者数 9	13	5	9	2	38	16	15	17	7	3	58	96	—	—
	2回目接種後	発症割合 78%	56%	52%	55%	17%	55%	67%	56%	69%	53%	65%	63%	59%	—	—
	発症者数 29	41	29	26	3	128	29	28	59	25	11	152	280	—	—	
	3回目接種後	発症割合 77%	69%	63%	62%	20%	63%	64%	62%	57%	38%	58%	55%	59%	54%	67%
	発症者数 20	53	36	32	4	145	21	23	42	19	19	124	269	170	99	
(5)関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	1回目接種後	発症割合 16%	10%	7%	8%	5%	9%	16%	17%	8%	15%	22%	14%	11%	—	—
		発症者数 6	7	4	4	1	22	7	9	7	7	4	34	56	—	—
	2回目接種後	発症割合 57%	32%	21%	32%	17%	32%	51%	36%	33%	30%	29%	36%	34%	—	—
	発症者数 21	23	12	15	3	74	22	18	28	14	5	87	161	—	—	
	3回目接種後	発症割合 54%	39%	54%	38%	15%	42%	64%	51%	38%	32%	39%	43%	42%	39%	50%
	発症者数 14	30	31	20	3	98	21	19	28	16	13	97	195	122	73	
(6)めまい	1回目接種後	発症割合 0%	1%	0%	0%	0%	0%	2%	8%	2%	0%	0%	3%	2%	—	—
		発症者数 0	1	0	0	0	1	1	4	2	0	0	7	8	—	—
	2回目接種後	発症割合 14%	4%	5%	4%	0%	6%	16%	8%	8%	0%	12%	8%	7%	—	—
	発症者数 5	3	3	2	0	13	7	4	7	0	2	20	33	—	—	
	3回目接種後	発症割合 15%	8%	7%	8%	10%	9%	6%	14%	11%	8%	0%	8%	8%	7%	12%
	発症者数 4	6	4	4	2	20	2	5	8	4	0	19	39	21	18	
(7)頭痛	1回目接種後	発症割合 5%	4%	5%	4%	11%	5%	18%	25%	9%	17%	22%	17%	11%	—	—
		発症者数 2	3	3	2	2	12	8	13	8	8	4	41	53	—	—
	2回目接種後	発症割合 54%	29%	30%	17%	6%	29%	44%	38%	50%	32%	41%	42%	36%	—	—
	発症者数 20	21	17	8	1	67	19	19	43	15	7	103	170	—	—	
	3回目接種後	発症割合 62%	47%	37%	31%	5%	39%	58%	62%	49%	40%	39%	49%	44%	41%	49%
	発症者数 16	36	21	16	1	90	19	23	36	20	13	111	201	129	72	
(8)その他(吐き気、リンパの腫れ・痛み、悪寒、下痢など)	1回目接種後	発症割合 3%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	6%	9%	4%	0%	6%	3%	—	—
		発症者数 1	0	0	0	0	1	2	3	8	2	0	15	16	—	—
	2回目接種後	発症割合 3%	4%	4%	2%	0%	3%	14%	12%	13%	11%	12%	12%	8%	—	—
	発症者数 1	3	2	1	0	7	6	6	11	5	2	30	37	—	—	
	3回目接種後	発症割合 19%	4%	5%	10%	0%	7%	21%	41%	19%	28%	6%	23%	15%	17%	10%
	発症者数 5	3	3	5	0	16	7	15	14	14	2	52	68	54	14	
(9)特に何もなかった	1回目接種後	発症割合 5%	1%	5%	10%	0%	5%	2%	0%	3%	0%	0%	2%	3%	—	—
		発症者数 2	1	3	5	0	11	1	0	3	0	0	4	15	—	—
	2回目接種後	発症割合 0%	1%	0%	6%	0%	2%	0%	2%	2%	4%	0%	2.1%	1.9%	—	—
	発症者数 0	1	0	3	0	4	0	1	2	2	0	5	9	—	—	
	3回目接種後	発症割合 8%	3%	0%	2%	25%	4%	6%	3%	3%	4%	12%	5%	5%	6%	2%
	発症者数 2	2	0	1	5	10	2	1	2	2	4	11	21	18	3	

2. 接種後の副反応ごとの状況について(※モデルナ接種者のみ別掲)

(1) 接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の発症割合グラフ(下表①と⑤の男女計)



◎接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(32名)	(65名)	(53名)	(41名)	(13名)	(204名)	(39名)	(47名)	(71名)	(39名)	(14名)	(210名)	(414名)	—
2回目接種後の年代別回答者数	(28名)	(58名)	(48名)	(27名)	(13名)	(174名)	(32名)	(38名)	(58名)	(32名)	(13名)	(173名)	(347名)	—
3回目接種後の年代別回答者数	(22名)	(70名)	(49名)	(43名)	(15名)	(199名)	(28名)	(34名)	(64名)	(44名)	(26名)	(196名)	(395名)	(131名)
接種日のみ	1回目接種後	—	—	—	2.4%	0.5%	2.6%	—	—	—	—	0.5%	0.5%	—
	2回目接種後	—	1.7%	—	—	7.7%	1.1%	—	2.6%	1.7%	6.3%	—	2.3%	1.7%
	3回目接種後	—	—	—	—	6.7%	0.5%	—	2.9%	—	—	—	0.5%	0.5%
接種日から翌日まで	1回目接種後	37.5%	30.8%	37.7%	31.7%	15.4%	32.8%	28.2%	23.4%	29.6%	30.8%	28.6%	28.1%	30.4%
	2回目接種後	32.1%	27.6%	35.4%	37.0%	38.5%	32.8%	50.0%	34.2%	27.6%	31.3%	23.1%	33.5%	33.1%
	3回目接種後	13.6%	15.7%	14.3%	23.3%	13.3%	16.6%	21.4%	17.6%	12.5%	15.9%	11.5%	15.3%	15.9%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	34.4%	47.7%	45.3%	31.7%	61.5%	42.6%	51.3%	55.3%	46.5%	38.5%	50.0%	48.1%	45.4%
	2回目接種後	35.7%	43.1%	41.7%	33.3%	46.2%	40.2%	37.5%	47.4%	46.6%	37.5%	53.8%	43.9%	42.1%
	3回目接種後	54.5%	51.4%	40.8%	53.5%	40.0%	48.7%	39.3%	38.2%	50.0%	38.6%	50.0%	43.9%	46.3%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	9.4%	6.2%	9.4%	22.0%	7.7%	10.8%	5.1%	2.1%	4.2%	5.1%	7.1%	4.3%	7.5%
	2回目接種後	10.7%	10.3%	16.7%	18.5%	—	12.6%	3.1%	2.6%	5.2%	—	7.7%	3.5%	8.1%
	3回目接種後	4.5%	2.9%	—	2.3%	—	2.0%	—	2.9%	3.1%	—	—	1.5%	1.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	15.6%	13.8%	7.5%	12.2%	15.4%	12.3%	12.8%	19.1%	12.7%	15.4%	14.3%	14.8%	13.5%
	2回目接種後	17.9%	15.5%	6.3%	11.1%	7.7%	12.1%	9.4%	13.2%	13.8%	12.5%	7.7%	12.1%	12.1%
	3回目接種後	13.6%	20.0%	36.7%	14.0%	33.3%	23.1%	25.0%	23.5%	26.6%	27.3%	30.8%	26.5%	24.8%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	3.1%	1.5%	—	—	—	1.0%	—	—	7.0%	10.3%	—	4.3%	2.7%
	2回目接種後	3.6%	1.7%	—	—	—	1.1%	—	—	5.2%	12.5%	7.7%	4.6%	2.9%
	3回目接種後	13.6%	10.0%	8.2%	7.0%	6.7%	9.0%	14.3%	14.7%	7.8%	18.2%	7.7%	12.2%	10.6%



②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
接種当日	1回目接種後	3.1%	9.2%	9.4%	9.8%	15.4%	8.8%	12.8%	12.8%	11.3%	17.9%	14.3%	13.3%	11.1%
	2回目接種後	3.6%	8.6%	4.2%	3.7%	7.7%	5.7%	9.4%	7.9%	3.4%	21.9%	7.7%	9.2%	7.5%
	3回目接種後	4.5%	2.9%	2.0%	7.0%	13.3%	4.5%	7.1%	8.8%	6.3%	11.4%	11.5%	8.7%	6.6%
接種日の翌日	1回目接種後	93.8%	90.8%	88.7%	90.2%	84.6%	90.2%	87.2%	87.2%	83.1%	76.9%	85.7%	83.8%	87.0%
	2回目接種後	89.3%	89.7%	89.6%	88.9%	84.6%	89.1%	81.3%	84.2%	86.2%	68.8%	61.5%	79.8%	84.4%
	3回目接種後	95.5%	90.0%	79.6%	83.7%	80.0%	85.9%	89.3%	88.2%	85.9%	77.3%	76.9%	83.7%	84.8%
接種日の翌々日	1回目接種後	3.1%	—	1.9%	—	—	1.0%	—	—	5.6%	2.6%	—	2.4%	1.7%
	2回目接種後	7.1%	—	6.3%	7.4%	7.7%	4.6%	9.4%	7.9%	10.3%	6.3%	23.1%	9.8%	7.2%
	3回目接種後	—	7.1%	14.3%	9.3%	6.7%	8.5%	3.6%	2.9%	7.8%	9.1%	11.5%	7.1%	7.8%
その他	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6%	—	0.5%	0.2%
	2回目接種後	—	1.7%	—	—	—	0.6%	—	—	—	3.1%	7.7%	1.2%	0.9%
	3回目接種後	—	—	4.1%	—	—	1.0%	—	—	—	2.3%	—	0.5%	0.8%

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
受診した	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	2.1%	—	—	—	0.5%	0.2%
	2回目接種後	—	1.7%	2.1%	—	7.7%	1.7%	—	2.6%	1.7%	—	—	1.2%	1.4%
	3回目接種後	—	1.4%	—	—	—	0.5%	—	—	1.6%	—	—	0.5%	0.5%
受診しなかった	1回目接種後	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.9%	100%	100%	100%	99.5%	99.8%
	2回目接種後	100%	98.3%	97.9%	100%	92.3%	98.3%	100%	97.4%	98.3%	100%	100%	98.8%	98.6%
	3回目接種後	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.5%	100%	100%	98.4%	100%	100%	99.5%	99.5%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	93.8%	100%	100%	100%	92.3%	98.5%	89.7%	93.6%	95.8%	100%	92.9%	94.8%	96.6%
	2回目接種後	89.3%	87.9%	89.6%	96.3%	92.3%	90.2%	90.6%	86.8%	86.2%	93.8%	84.6%	88.4%	89.3%
	3回目接種後	72.7%	80.0%	81.6%	81.4%	86.7%	80.4%	71.4%	82.4%	79.7%	79.5%	88.5%	80.1%	80.3%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅安静にしていた	1回目接種後	6.3%	—	—	—	7.7%	1.5%	10.3%	6.4%	4.2%	—	7.1%	5.2%	3.4%
	2回目接種後	10.7%	12.1%	10.4%	3.7%	7.7%	9.8%	9.4%	13.2%	13.8%	6.3%	15.4%	11.6%	10.7%
	3回目接種後	27.3%	20.0%	18.4%	18.6%	13.3%	19.6%	28.6%	17.6%	20.3%	20.5%	11.5%	19.9%	19.7%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
	(21名)	(67名)	(45名)	(38名)	(12名)	(183名)	(27名)	(32名)	(61名)	(40名)	(25名)	(185名)	(368名)	(122名)
2回目よりも症状が重かったと思う	33.3%	38.8%	46.7%	55.3%	33.3%	43.2%	37.0%	34.4%	31.1%	32.5%	40.0%	34.1%	38.6%	53.3%
2回目よりも症状が軽かったと思う	33.3%	19.4%	8.9%	15.8%	25.0%	18.0%	25.9%	37.5%	32.8%	32.5%	16.0%	30.3%	24.2%	12.3%
2回目と同じ程度だったと思う	33.3%	41.8%	44.4%	28.9%	41.7%	38.8%	37.0%	28.1%	36.1%	35.0%	44.0%	35.7%	37.2%	34.4%

(2) 発熱(37.5℃以上)の発症割合グラフ(下表①と⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃以上)の症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数		(1名)	(1名)	(1名)	(1名)	(0名)	(4名)	(3名)	(1名)	(2名)	(0名)	(2名)	(8名)	(12名)	—
2回目接種後の年代別回答者数		(25名)	(30名)	(17名)	(11名)	(1名)	(84名)	(22名)	(30名)	(40名)	(16名)	(3名)	(111名)	(195名)	—
3回目接種後の年代別回答者数		(18名)	(41名)	(29名)	(19名)	(2名)	(109名)	(11名)	(24名)	(21名)	(15名)	(8名)	(79名)	(188名)	(89名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	50.0%	-	-	25.0%	16.7%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	3.3%	2.5%	-	-	1.8%	1.0%	—
	3回目接種後	5.6%	-	-	-	-	0.9%	-	8.3%	-	-	-	2.5%	1.6%	—
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	66.7%	-	50.0%	-	50.0%	50.0%	33.3%	—
	2回目接種後	24.0%	16.7%	47.1%	36.4%	-	27.4%	22.7%	26.7%	12.5%	18.8%	33.3%	19.8%	23.1%	—
	3回目接種後	22.2%	19.5%	20.7%	15.8%	50%	20.2%	36.4%	25.0%	23.8%	20.0%	12.5%	24.1%	21.8%	16.9%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	2回目接種後	12.0%	6.7%	11.8%	9.1%	-	9.5%	13.6%	20.0%	15.0%	12.5%	33.3%	16.2%	13.3%	—
	3回目接種後	5.6%	12.2%	10.3%	15.8%	-	11.0%	-	25.0%	19.0%	26.7%	12.5%	19.0%	14.4%	12.4%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	100%	-	100%	100%	-	75.0%	-	-	-	-	-	-	25.0%	—
	2回目接種後	52.0%	63.3%	35.3%	27.3%	100%	50.0%	45.5%	43.3%	55.0%	43.8%	33.3%	47.7%	48.7%	—
	3回目接種後	50.0%	48.8%	27.6%	31.6%	-	39.4%	45.5%	16.7%	38.1%	40.0%	37.5%	32.9%	36.7%	38.2%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	12.5%	8.3%	—
	2回目接種後	12.0%	13.3%	5.9%	27.3%	-	13.1%	13.6%	6.7%	15.0%	25.0%	-	13.5%	13.3%	—
	3回目接種後	16.7%	19.5%	41.4%	36.8%	50.0%	28.4%	18.2%	25.0%	19.0%	13.3%	37.5%	21.5%	25.5%	32.6%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	-	100%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	50.0%	12.5%	16.7%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	4.5%	-	-	-	-	0.9%	0.5%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—

②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	50.0%	-	-	25.0%	16.7%	—
	2回目接種後	-	-	5.9%	-	-	1.2%	-	3.3%	5.0%	6.3%	-	3.6%	2.6%	—
	3回目接種後	5.6%	-	-	5.3%	-	1.8%	9.1%	4.2%	-	-	-	2.5%	2.1%	—
接種日の翌日	1回目接種後	100%	-	100%	100%	-	75.0%	66.7%	100%	50.0%	-	50.0%	62.5%	66.7%	—
	2回目接種後	92.0%	100%	82.4%	100%	100%	94.0%	95.5%	96.7%	95.0%	81.3%	100%	93.7%	93.8%	—
	3回目接種後	94%	98%	79.3%	94.7%	100%	91.7%	90.9%	95.8%	95.2%	93.3%	87.5%	93.7%	92.6%	94.4%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	100%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	8.3%	—
	2回目接種後	8.0%	-	11.8%	-	-	4.8%	4.5%	-	-	12.5%	-	2.7%	3.6%	—
	3回目接種後	-	2.4%	20.7%	-	-	6.4%	-	-	4.8%	6.7%	12.5%	3.8%	5.3%	5.6%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	12.5%	8.3%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目接種後	-	100%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	8.3%	—
	2回目接種後	4.0%	6.7%	-	-	-	3.6%	4.5%	6.7%	7.5%	-	-	5.4%	4.6%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
受診しなかった	1回目接種後	100%	-	100%	100%	-	75.0%	100%	100%	100%	-	100%	100%	91.7%	—
	2回目接種後	96.0%	93.3%	100%	100%	100%	96.4%	95.5%	93.3%	92.5%	100%	100%	94.6%	95.4%	—
	3回目接種後	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	-	100%	-	-	25.0%	33.3%	-	100%	-	50.0%	50.0%	41.7%	—
	2回目接種後	28.0%	16.7%	29.4%	27.3%	-	23.8%	22.7%	23.3%	32.5%	43.8%	66.7%	30.6%	27.7%	—
	3回目接種後	22.2%	17.1%	10.3%	21.1%	-	16.5%	18.2%	20.8%	9.5%	26.7%	37.5%	20.3%	18.1%	12.4%
高熱により、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	100%	100%	-	100%	-	75.0%	66.7%	100%	-	-	50.0%	50.0%	58.3%	—
	2回目接種後	72.0%	83.3%	70.6%	72.7%	100%	76.2%	77.3%	76.7%	67.5%	56.3%	33.3%	69.4%	72.3%	—
	3回目接種後	77.8%	82.9%	89.7%	78.9%	100%	83.5%	81.8%	79.2%	90.5%	73.3%	62.5%	79.7%	81.9%	87.6%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。		男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
		(15名)	(22名)	(12名)	(8名)	(0名)	(57名)	(8名)	(21名)	(17名)	(10名)	(5名)	(61名)	(118名)	(44名)
2回目よりも症状が重かったと思う		20.0%	50.0%	41.7%	12.5%	-	35.1%	25.0%	47.6%	41.2%	50.0%	20.0%	41.0%	38.1%	52.3%
2回目よりも症状が軽かったと思う		53.3%	13.6%	8.3%	25.0%	-	24.6%	62.5%	47.6%	29.4%	20.0%	20.0%	37.7%	31.4%	18.2%
2回目と同じ程度だったと思う		26.7%	36.4%	50.0%	62.5%	-	40.4%	12.5%	4.8%	29.4%	30.0%	60.0%	21.3%	30.5%	29.5%



◎発熱(37.5℃未満)の症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(4名)	(0名)	(2名)	(1名)	(7名)	(5名)	(4名)	(5名)	(3名)	(1名)	(18名)	(25名)	—
2回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(16名)	(14名)	(12名)	(2名)	(48名)	(9名)	(4名)	(12名)	(5名)	(4名)	(34名)	(82名)	—
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(14名)	(14名)	(10名)	(4名)	(46名)	(11名)	(5名)	(19名)	(6名)	(2名)	(43名)	(89名)	(23名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	20.0%	25.0%	20.0%	-	-	16.7%	12.0%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	50.0%	8.8%	3.7%	—
	3回目接種後	-	7.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1%	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	50.0%	-	50.0%	100%	60.0%	25.0%	40.0%	33.3%	-	38.9%	44.0%	—
	2回目接種後	25.0%	31.3%	28.6%	16.7%	-	55.6%	75.0%	66.7%	-	25.0%	50.0%	35.4%	—
	3回目接種後	25.0%	28.6%	42.9%	20.0%	-	27.3%	20.0%	52.6%	50.0%	100%	44.2%	36.0%	26.1%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7%	100%	16.7%	12.0%	—
	2回目接種後	-	-	21.4%	8.3%	-	-	-	-	20.0%	-	2.9%	6.1%	—
	3回目接種後	-	7.1%	7.1%	10.0%	50.0%	-	20.0%	5.3%	16.7%	-	7.0%	9.0%	8.7%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	50.0%	-	-	-	20.0%	50.0%	40.0%	-	-	27.8%	28.0%	—
	2回目接種後	75.0%	68.8%	50.0%	58.3%	100%	11.1%	25.0%	33.3%	40.0%	25.0%	26.5%	47.6%	—
	3回目接種後	25.0%	50.0%	35.7%	40.0%	25.0%	45.5%	60.0%	42.1%	33.3%	-	41.9%	40.4%	47.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	4.0%	—
	2回目接種後	-	-	-	8.3%	-	33.3%	-	-	20.0%	-	11.8%	6.1%	—
	3回目接種後	50.0%	7.1%	14.3%	30.0%	25.0%	18.2%	-	-	-	-	4.7%	12.4%	17.4%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	2回目接種後	-	-	-	8.3%	-	-	-	-	-	-	-	1.2%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	9.1%	-	-	-	-	2.3%	1.1%	-

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	40.0%	25.0%	20.0%	-	-	22.2%	16.0%	—
	2回目接種後	-	6.3%	-	-	-	-	-	-	20.0%	50.0%	8.8%	4.9%	—
	3回目接種後	-	7.1%	7.1%	10.0%	-	-	-	10.5%	16.7%	-	7.0%	6.7%	8.7%
接種日の翌日	1回目接種後	-	100%	-	100%	100%	60.0%	75.0%	80.0%	66.7%	100%	72.2%	80.0%	—
	2回目接種後	100%	93.8%	100%	100%	100%	88.9%	100%	100%	40.0%	50.0%	82.4%	91.5%	—
	3回目接種後	75.0%	85.7%	78.6%	70.0%	75.0%	81.8%	100%	84.2%	66.7%	100%	83.7%	80.9%	82.6%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	5.6%	4.0%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	11.1%	-	-	40.0%	-	8.8%	3.7%	—
	3回目接種後	25.0%	7.1%	7.1%	20.0%	25.0%	18.2%	-	-	16.7%	-	7.0%	10.1%	8.7%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	3回目接種後	-	-	7.1%	-	-	-	-	5.3%	-	-	2.3%	2.2%	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	100%	11.1%	8.0%	—
	2回目接種後	-	-	-	8.3%	-	22.2%	-	-	-	-	5.9%	3.7%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	9.1%	-	-	-	-	2.3%	1.1%	-
受診しなかった	1回目接種後	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	80.0%	100%	-	88.9%	92.0%	—
	2回目接種後	100%	100%	100%	91.7%	100%	77.8%	100%	100%	100%	100%	94.1%	96.3%	—
	3回目接種後	100%	100%	100%	100%	100%	90.9%	100%	100%	100%	100%	97.7%	98.9%	100%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計			
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	100%	-	100%	-	85.7%	80.0%	50.0%	80.0%	33.3%	100%	66.7%	72.0%	—
	2回目接種後	50.0%	81.3%	85.7%	66.7%	50.0%	75.0%	66.7%	75.0%	66.7%	60.0%	75.0%	67.6%	72.0%	—
	3回目接種後	25.0%	57.1%	78.6%	70.0%	75.0%	65.2%	45.5%	100%	52.6%	83.3%	50.0%	60.5%	62.9%	65.2%
発熱により、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	100%	14.3%	20.0%	50.0%	20.0%	66.7%	-	33.3%	28.0%	—
	2回目接種後	50.0%	18.8%	14.3%	33.3%	50.0%	25.0%	33.3%	25.0%	33.3%	40.0%	25.0%	32.4%	28.0%	—
	3回目接種後	75.0%	42.9%	21.4%	30.0%	25.0%	34.8%	54.5%	-	47.4%	16.7%	50.0%	39.5%	37.1%	34.8%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
	(0名)	(8名)	(8名)	(5名)	(1名)	(22名)	(6名)	(1名)	(4名)	(3名)	(1名)	(15名)	(37名)	(7名)
2回目よりも症状が重かったと思う	-	-	25.0%	60.0%	-	22.7%	33.3%	-	25.0%	33.3%	-	26.7%	24.3%	42.9%
2回目よりも症状が軽かったと思う	-	37.5%	37.5%	20.0%	-	31.8%	66.7%	100%	25.0%	33.3%	-	46.7%	37.8%	42.9%
2回目と同じ程度だったと思う	-	62.5%	37.5%	20.0%	100%	45.5%	-	-	50.0%	33.3%	100%	26.7%	37.8%	14.3%



◎倦怠感(だるさ、疲れなど)の症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(9名)	(13名)	(5名)	(9名)	(2名)	(38名)	(16名)	(15名)	(17名)	(7名)	(3名)	(58名)	(96名)	—
2回目接種後の年代別回答者数	(29名)	(41名)	(29名)	(26名)	(3名)	(128名)	(29名)	(28名)	(59名)	(25名)	(11名)	(152名)	(280名)	—
3回目接種後の年代別回答者数	(20名)	(53名)	(36名)	(32名)	(4名)	(145名)	(21名)	(23名)	(42名)	(19名)	(19名)	(124名)	(269名)	(99名)
接種日のみ	1回目接種後	11.1%	—	—	—	5.3%	—	—	—	—	—	—	2.1%	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0%	—	1.3%	0.7%	—
	3回目接種後	5.0%	—	—	—	0.7%	—	4.3%	—	—	—	0.8%	0.7%	—
接種日から翌日まで	1回目接種後	44.4%	30.8%	20.0%	55.6%	36.8%	43.8%	46.7%	52.9%	—	—	39.7%	38.5%	—
	2回目接種後	27.6%	24.4%	27.6%	26.9%	25.8%	34.5%	25.0%	20.3%	12.0%	27.3%	23.0%	24.3%	—
	3回目接種後	20.0%	18.9%	16.7%	12.5%	16.6%	28.6%	17.4%	23.8%	21.1%	15.8%	21.8%	19.0%	11.1%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	11.1%	46.2%	40.0%	11.1%	28.9%	43.8%	20.0%	29.4%	57.1%	66.7%	36.2%	33.3%	—
	2回目接種後	17.2%	19.5%	31.0%	11.5%	20.3%	31.0%	39.3%	30.5%	32.0%	27.3%	32.2%	26.8%	—
	3回目接種後	30.0%	34.0%	16.7%	28.1%	29.0%	23.8%	52.2%	33.3%	15.8%	42.1%	33.9%	31.2%	25.3%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	33.3%	23.1%	40.0%	11.1%	23.7%	—	6.7%	—	—	—	1.7%	10.4%	—
	2回目接種後	34.5%	36.6%	27.6%	34.6%	32.8%	17.2%	10.7%	27.1%	16.0%	36.4%	21.1%	26.4%	—
	3回目接種後	—	15.1%	19.4%	12.5%	13.1%	23.8%	13.0%	9.5%	5.3%	10.5%	12.1%	12.6%	16.2%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	—	—	—	22.2%	5.3%	12.5%	20.0%	17.6%	28.6%	33.3%	19.0%	13.5%	—
	2回目接種後	13.8%	19.5%	13.8%	26.9%	19.5%	17.2%	17.9%	18.6%	24.0%	—	17.8%	18.6%	—
	3回目接種後	40.0%	32.1%	41.7%	46.9%	38.6%	19.0%	8.7%	33.3%	52.6%	31.6%	29.0%	34.2%	45.5%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	6.7%	—	14.3%	—	3.4%	2.1%	—
	2回目接種後	6.9%	—	—	—	1.6%	—	7.1%	3.4%	8.0%	9.1%	4.6%	3.2%	—
	3回目接種後	5.0%	—	5.6%	—	2.1%	4.8%	4.3%	—	5.3%	—	2.4%	2.2%	2.0%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目接種後	—	—	—	11.1%	5.3%	—	6.7%	11.8%	—	—	5.2%	5.2%	—
	2回目接種後	—	2.4%	—	—	0.8%	10.3%	—	3.4%	12.0%	—	5.3%	3.2%	—
	3回目接種後	5.0%	—	—	—	0.7%	—	4.3%	—	—	5.3%	1.6%	1.1%	—
接種日の翌日	1回目接種後	88.9%	100%	100%	77.8%	89.5%	93.8%	73.3%	82.4%	71.4%	100%	82.8%	85.4%	—
	2回目接種後	93.1%	95.1%	89.7%	100%	93.8%	75.9%	82.1%	79.7%	68.0%	90.9%	78.3%	85.4%	—
	3回目接種後	95%	92.5%	66.7%	84.4%	84.8%	90.5%	73.9%	78.6%	89.5%	84.2%	82.3%	83.6%	80.8%
接種日の翌々日	1回目接種後	11.1%	—	—	11.1%	5.3%	6.3%	20.0%	5.9%	28.6%	—	12.1%	9.4%	—
	2回目接種後	6.9%	2.4%	10.3%	—	5.5%	13.8%	17.9%	16.9%	20.0%	9.1%	16.4%	11.4%	—
	3回目接種後	—	7.5%	33.3%	15.6%	14.5%	4.8%	21.7%	21.4%	10.5%	10.5%	15.3%	14.9%	19.2%
その他	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3回目接種後	—	—	—	—	—	4.8%	—	—	—	—	0.8%	0.4%	—

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2回目接種後	3.4%	2.4%	—	—	1.6%	3.4%	3.6%	5.1%	—	—	3.3%	2.5%	—
	3回目接種後	—	3.8%	—	3.1%	2.1%	—	4.3%	—	—	—	0.8%	1.5%	2.0%
受診しなかった	1回目接種後	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—
	2回目接種後	96.6%	97.6%	100%	100%	98.4%	96.6%	96.4%	94.9%	100%	100%	96.7%	97.5%	—
	3回目接種後	100%	96.2%	100%	96.9%	97.9%	100%	95.7%	100%	100%	100%	99.2%	98.5%	98.0%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100%	100%	100%	77.8%	92.1%	81.3%	86.7%	88.2%	71.4%	66.7%	82.8%	86.5%	—
	2回目接種後	41.4%	53.7%	65.5%	57.7%	54.7%	44.8%	57.1%	49.2%	68.0%	54.5%	53.3%	53.9%	—
	3回目接種後	40.0%	35.8%	50.0%	50.0%	43.4%	47.6%	43.5%	50.0%	36.8%	63.2%	48.4%	45.7%	35.4%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	—	—	—	22.2%	7.9%	18.8%	13.3%	11.8%	28.6%	33.3%	17.2%	13.5%	—
	2回目接種後	58.6%	46.3%	34.5%	42.3%	45.3%	55.2%	42.9%	50.8%	32.0%	45.5%	46.7%	46.1%	—
	3回目接種後	60.0%	64.2%	50.0%	50.0%	56.6%	52.4%	56.5%	50.0%	63.2%	36.8%	51.6%	54.3%	64.6%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
2回目よりも症状が重かったと思う	(18名)	(46名)	(23名)	(22名)	(3名)	(112名)	(18名)	(20名)	(36名)	(19名)	(18名)	(111名)	(223名)	(72名)
2回目よりも症状が軽かったと思う	38.9%	52.2%	43.5%	54.5%	66.7%	49.1%	27.8%	30.0%	36.1%	68.4%	38.9%	39.6%	44.4%	61.1%
2回目と同じ程度だったと思う	22.2%	13.0%	17.4%	18.2%	—	16.1%	44.4%	50.0%	33.3%	10.5%	16.7%	31.5%	23.8%	11.1%
2回目と同じ程度だったと思う	38.9%	34.8%	39.1%	27.3%	33.3%	34.8%	27.8%	20.0%	30.6%	21.1%	44.4%	28.8%	31.8%	27.8%



◎関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計			
1回目接種後の年代別回答者数	(6名)	(7名)	(4名)	(4名)	(1名)	(22名)	(7名)	(9名)	(7名)	(7名)	(4名)	(34名)	(56名)	—	
2回目接種後の年代別回答者数	(21名)	(23名)	(12名)	(15名)	(3名)	(74名)	(22名)	(18名)	(28名)	(14名)	(5名)	(87名)	(161名)	—	
3回目接種後の年代別回答者数	(14名)	(30名)	(31名)	(20名)	(3名)	(98名)	(21名)	(19名)	(28名)	(16名)	(13名)	(97名)	(195名)	(73名)	
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	14.3%	-	-	-	-	2.9%	1.8%	—	
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	
接種日から翌日まで	1回目接種後	66.7%	28.6%	25.0%	50.0%	-	40.9%	14.3%	44.4%	-	28.6%	50.0%	26.5%	32.1%	—
	2回目接種後	42.9%	21.7%	25.0%	26.7%	-	28.4%	40.9%	27.8%	10.7%	21.4%	-	23.0%	25.5%	—
	3回目接種後	14.3%	23.3%	16.1%	15.0%	-	17.3%	19.0%	21.1%	21.4%	12.5%	7.7%	17.5%	17.4%	11.0%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	16.7%	28.6%	25.0%	-	-	18.2%	57.1%	33.3%	57.1%	28.6%	25.0%	41.2%	32.1%	—
	2回目接種後	14.3%	21.7%	25.0%	6.7%	33.3%	17.6%	18.2%	44.4%	17.9%	21.4%	80.0%	27.6%	23.0%	—
	3回目接種後	28.6%	23.3%	16.1%	25.0%	33.3%	22.4%	28.6%	26.3%	28.6%	43.8%	46.2%	33.0%	27.7%	19.2%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	14.3%	-	-	-	4.5%	-	-	28.6%	-	-	5.9%	5.4%	—
	2回目接種後	28.6%	43.5%	33.3%	20.0%	33.3%	32.4%	27.3%	5.6%	39.3%	28.6%	20.0%	26.4%	29.2%	—
	3回目接種後	7.1%	20.0%	16.1%	15.0%	-	15.3%	28.6%	10.5%	7.1%	12.5%	-	12.4%	13.8%	17.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	16.7%	28.6%	50.0%	25.0%	100%	31.8%	14.3%	11.1%	14.3%	28.6%	-	14.7%	21.4%	—
	2回目接種後	14.3%	13.0%	16.7%	40.0%	33.3%	20.3%	13.6%	11.1%	32.1%	28.6%	-	20.7%	20.5%	—
	3回目接種後	50.0%	33.3%	48.4%	45.0%	66.7%	43.9%	23.8%	36.8%	35.7%	31.3%	38.5%	33.0%	38.5%	50.7%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	-	-	-	25.0%	-	4.5%	-	11.1%	-	14.3%	25.0%	8.8%	7.1%	—
	2回目接種後	-	-	-	6.7%	-	1.4%	-	11.1%	-	-	-	2.3%	1.9%	—
	3回目接種後	-	-	3.2%	-	-	1.0%	-	5.3%	7.1%	-	7.7%	4.1%	2.6%	1.4%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計			
接種当日	1回目接種後	16.7%	-	-	-	-	4.5%	42.9%	11.1%	-	14.3%	-	14.7%	10.7%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	3回目接種後	-	3.3%	-	5.0%	-	2.0%	-	5.3%	-	6.3%	-	2.1%	2.1%	1.4%
接種日の翌日	1回目接種後	83.3%	100%	100%	50.0%	100%	86.4%	42.9%	55.6%	71.4%	57.1%	75.0%	58.8%	69.6%	—
	2回目接種後	90.5%	95.7%	91.7%	93.3%	100%	93.2%	90.9%	77.8%	96.4%	71.4%	80.0%	86.2%	89.4%	—
	3回目接種後	92.9%	80.0%	64.5%	80.0%	66.7%	76.5%	90.5%	68.4%	71.4%	75.0%	76.9%	76.3%	76.4%	75.3%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	25.0%	-	4.5%	14.3%	33.3%	28.6%	14.3%	25.0%	23.5%	16.1%	—
	2回目接種後	9.5%	4.3%	8.3%	-	-	5.4%	9.1%	16.7%	3.6%	28.6%	20.0%	12.6%	9.3%	—
	3回目接種後	7.1%	16.7%	35.5%	15.0%	33.3%	21.4%	4.8%	26.3%	28.6%	18.8%	23.1%	20.6%	21.0%	23.3%
その他	1回目接種後	-	-	-	25.0%	-	4.5%	-	-	-	14.3%	-	2.9%	3.6%	—
	2回目接種後	-	-	-	6.7%	-	1.4%	-	5.6%	-	-	-	1.1%	1.2%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	4.8%	-	-	-	-	1.0%	0.5%	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計			
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	2回目接種後	-	4.3%	-	-	-	1.4%	-	-	7.1%	-	-	2.3%	1.9%	—
	3回目接種後	-	3.3%	-	-	-	1.0%	-	5.3%	-	-	-	1.0%	1.0%	-
受診しなかった	1回目接種後	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—
	2回目接種後	100%	95.7%	100%	100%	100%	98.6%	100%	100%	92.9%	100%	100%	97.7%	98.1%	—
	3回目接種後	100%	96.7%	100%	100%	100%	99.0%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.0%	99.0%	100%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計			
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100%	100%	100%	75.0%	100%	95.5%	100%	77.8%	100%	100%	75.0%	91.2%	92.9%	—
	2回目接種後	42.9%	60.9%	58.3%	53.3%	66.7%	54.1%	45.5%	72.2%	39.3%	78.6%	60.0%	55.2%	54.7%	—
	3回目接種後	50.0%	43.3%	51.6%	40.0%	33.3%	45.9%	61.9%	42.1%	39.3%	37.5%	61.5%	47.4%	46.7%	37.0%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	25.0%	-	4.5%	-	22.2%	-	-	25.0%	8.8%	7.1%	—
	2回目接種後	57.1%	39.1%	41.7%	46.7%	33.3%	45.9%	54.5%	27.8%	60.7%	21.4%	40.0%	44.8%	45.3%	—
	3回目接種後	50.0%	56.7%	48.4%	60.0%	66.7%	54.1%	38.1%	57.9%	60.7%	62.5%	38.5%	52.6%	53.3%	63.0%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
	(10名)	(23名)	(14名)	(16名)	(0名)	(63名)	(16名)	(11名)	(19名)	(9名)	(11名)	(66名)	(129名)	(42名)
2回目よりも症状が重かったと思う	40.0%	56.5%	50.0%	62.5%	-	54.0%	31.3%	63.6%	57.9%	88.9%	36.4%	53.0%	53.5%	66.7%
2回目よりも症状が軽かったと思う	20.0%	8.7%	-	12.5%	-	9.5%	50.0%	27.3%	15.8%	11.1%	-	22.7%	16.3%	9.5%
2回目と同じ程度だったと思う	40.0%	34.8%	50.0%	25.0%	-	36.5%	18.8%	9.1%	26.3%	-	63.6%	24.2%	30.2%	23.8%



◎めまいの症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(1名)	(4名)	(2名)	(0名)	(0名)	(7名)	(8名)	—
2回目接種後の年代別回答者数	(5名)	(3名)	(3名)	(2名)	(0名)	(13名)	(7名)	(4名)	(7名)	(0名)	(2名)	(20名)	(33名)	—
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(6名)	(4名)	(4名)	(2名)	(20名)	(2名)	(5名)	(8名)	(4名)	(0名)	(19名)	(39名)	(18名)
接種日のみ	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	50.0%	10.0%	6.1%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	-	5.3%	2.6%	-
接種日から翌日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	100%	25.0%	100%	-	-	57.1%	50.0%	—
	2回目接種後	20.0%	-	-	-	-	7.7%	42.9%	25.0%	14.3%	-	25.0%	18.2%	—
	3回目接種後	25.0%	16.7%	25.0%	-	-	15.0%	50.0%	-	-	25.0%	10.5%	12.8%	16.7%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%	—
	2回目接種後	-	66.7%	66.7%	-	-	30.8%	-	-	28.6%	-	50.0%	21.2%	—
	3回目接種後	-	33.3%	25.0%	25.0%	-	20.0%	-	40.0%	12.5%	25.0%	-	21.1%	20.5%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	12.5%	—
	2回目接種後	80.0%	33.3%	33.3%	-	-	46.2%	28.6%	-	57.1%	-	30.0%	36.4%	—
	3回目接種後	25.0%	33.3%	25.0%	-	-	20.0%	-	40.0%	12.5%	25.0%	-	21.1%	20.5%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
	2回目接種後	-	-	-	50.0%	-	7.7%	28.6%	25.0%	-	-	15.0%	12.1%	—
	3回目接種後	25.0%	16.7%	25.0%	75.0%	100%	40.0%	50.0%	20.0%	62.5%	25.0%	-	42.1%	41.0%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%	—
	2回目接種後	-	-	-	50.0%	-	7.7%	-	25.0%	-	-	5.0%	6.1%	—
	3回目接種後	25.0%	-	-	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	2.6%	-

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	28.6%	25.0%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	14.3%	-	100%	20.0%	12.1%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	5.3%	2.6%	-
接種日の翌日	1回目接種後	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	100%	-	42.9%	50.0%	—
	2回目接種後	100%	66.7%	33.3%	50.0%	-	69.2%	85.7%	25.0%	71.4%	-	60.0%	63.6%	—
	3回目接種後	100%	100%	75.0%	50.0%	50%	80.0%	100%	60.0%	50.0%	100%	-	68.4%	74.4%
接種日の翌々日	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%	—
	2回目接種後	-	33.3%	66.7%	50.0%	-	30.8%	14.3%	25.0%	14.3%	-	15.0%	21.2%	—
	3回目接種後	-	-	25.0%	50.0%	50.0%	20.0%	-	40.0%	37.5%	-	26.3%	23.1%	22.2%
その他	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%	—
	2回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	5.0%	3.0%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%	—
	2回目接種後	-	33.3%	-	-	-	7.7%	-	-	14.3%	-	5.0%	6.1%	—
	3回目接種後	-	-	-	-	50.0%	5.0%	-	-	-	-	-	2.6%	5.6%
受診しなかった	1回目接種後	-	100%	-	-	-	100%	100%	75.0%	100%	-	85.7%	87.5%	—
	2回目接種後	100%	66.7%	100%	100%	-	92.3%	100%	100%	85.7%	-	100%	93.9%	—
	3回目接種後	100%	100%	100%	100%	50%	95%	100%	100%	100%	100%	-	97.4%	94.4%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	-	100%	-	-	-	100%	-	50.0%	50.0%	-	42.9%	50.0%	—
	2回目接種後	40.0%	33.3%	66.7%	100%	-	53.8%	42.9%	100%	42.9%	-	100%	57.6%	—
	3回目接種後	25.0%	33.3%	50.0%	-	-	25.0%	50.0%	20.0%	25.0%	50.0%	-	31.6%	28.2%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	-	-	-	-	-	-	100%	50.0%	50.0%	-	57.1%	50.0%	—
	2回目接種後	60.0%	66.7%	33.3%	-	-	46.2%	57.1%	-	57.1%	-	40.0%	42.4%	—
	3回目接種後	75.0%	66.7%	50.0%	100%	100%	75.0%	50.0%	80.0%	75.0%	50.0%	-	68.4%	71.8%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
2回目よりも症状が重かったと思う	(4名)	(1名)	(0名)	(1名)	(0名)	(6名)	(1名)	(0名)	(2名)	(1名)	(0名)	(4名)	(10名)	(2名)
2回目よりも症状が軽かったと思う	50.0%	-	-	100%	-	50.0%	-	-	50.0%	100%	-	50.0%	50.0%	50.0%
2回目と同じ程度だったと思う	25.0%	-	-	-	-	16.7%	100%	-	-	-	-	25.0%	20.0%	-
2回目と同じ程度だったと思う	25.0%	100.0%	-	-	-	33.3%	-	-	50.0%	-	-	25.0%	30.0%	50.0%



◎頭痛の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数		(2名)	(3名)	(3名)	(2名)	(2名)	(12名)	(8名)	(13名)	(8名)	(8名)	(4名)	(41名)	(53名)	—
2回目接種後の年代別回答者数		(20名)	(21名)	(17名)	(8名)	(1名)	(67名)	(19名)	(19名)	(43名)	(15名)	(7名)	(103名)	(170名)	—
3回目接種後の年代別回答者数		(16名)	(36名)	(21名)	(16名)	(1名)	(90名)	(19名)	(23名)	(36名)	(20名)	(13名)	(111名)	(201名)	(72名)
接種日のみ	1回目接種後	50.0%	—	33.3%	—	—	16.7%	—	15.4%	12.5%	—	—	7.3%	9.4%	—
	2回目接種後	—	4.8%	—	—	100%	3.0%	—	—	2.3%	6.7%	—	1.9%	2.4%	—
	3回目接種後	—	2.8%	9.5%	—	—	3.3%	10.5%	8.7%	—	5.0%	—	4.5%	4.0%	6.9%
接種日から翌日まで	1回目接種後	—	—	—	50.0%	—	8.3%	50.0%	23.1%	37.5%	37.5%	25.0%	34.1%	28.3%	—
	2回目接種後	30.0%	19.0%	29.4%	12.5%	—	23.9%	52.6%	15.8%	25.6%	—	28.6%	25.2%	24.7%	—
	3回目接種後	12.5%	5.6%	19.0%	6.3%	—	10.0%	21.1%	8.7%	27.8%	45.0%	15.4%	24.3%	17.9%	6.9%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	—	—	—	—	50.0%	8.3%	50.0%	23.1%	25.0%	12.5%	50.0%	29.3%	24.5%	—
	2回目接種後	15.0%	14.3%	23.5%	25.0%	—	17.9%	5.3%	47.4%	18.6%	33.3%	28.6%	24.3%	21.8%	—
	3回目接種後	25.0%	19.4%	14.3%	25.0%	100.0%	21.1%	10.5%	30.4%	27.8%	15.0%	53.8%	26.1%	23.9%	18.1%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	50.0%	100%	33.3%	—	50.0%	50.0%	—	15.4%	—	12.5%	—	7.3%	17.0%	—
	2回目接種後	20.0%	38.1%	35.3%	37.5%	—	31.3%	21.1%	10.5%	34.9%	13.3%	28.6%	24.3%	27.1%	—
	3回目接種後	6.3%	33.3%	14.3%	6.3%	—	18.9%	26.3%	8.7%	13.9%	20.0%	—	14.4%	16.4%	22.2%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	—	—	33.3%	50.0%	—	16.7%	—	15.4%	12.5%	25.0%	25.0%	14.6%	15.1%	—
	2回目接種後	30.0%	19.0%	11.8%	12.5%	—	19.4%	10.5%	21.1%	11.6%	46.7%	14.3%	18.4%	18.8%	—
	3回目接種後	50.0%	33.3%	38.1%	50.0%	—	40.0%	31.6%	30.4%	27.8%	10.0%	30.8%	26.1%	32.3%	41.7%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	7.7%	12.5%	12.5%	—	7.3%	5.7%	—
	2回目接種後	5.0%	4.8%	—	12.5%	—	4.5%	10.5%	5.3%	7.0%	—	—	5.8%	5.3%	—
	3回目接種後	6.3%	5.6%	4.8%	12.5%	—	6.7%	—	13.0%	2.8%	5.0%	—	4.5%	5.5%	4.2%

②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目接種後	50.0%	—	33.3%	50.0%	—	25.0%	25.0%	15.4%	25.0%	25.0%	—	19.5%	20.8%	—
	2回目接種後	5.0%	9.5%	—	—	100%	6.0%	5.3%	5.3%	7.0%	6.7%	—	5.8%	5.9%	—
	3回目接種後	—	—	4.8%	6.3%	—	2.2%	10.5%	8.7%	2.8%	5.0%	7.7%	6.3%	4.5%	2.8%
接種日の翌日	1回目接種後	50.0%	100%	33.3%	50.0%	100%	66.7%	62.5%	69.2%	62.5%	37.5%	75.0%	61.0%	62.3%	—
	2回目接種後	90.0%	76.2%	82.4%	87.5%	—	82.1%	73.7%	84.2%	79.1%	73.3%	71.4%	77.7%	79.4%	—
	3回目接種後	81.3%	86.1%	61.9%	68.8%	100.0%	76.7%	78.9%	73.9%	86.1%	80.0%	76.9%	80.2%	78.6%	76.4%
接種日の翌々日	1回目接種後	—	—	33.3%	—	—	8.3%	12.5%	7.7%	12.5%	37.5%	25.0%	17.1%	15.1%	—
	2回目接種後	5.0%	14.3%	17.6%	12.5%	—	11.9%	21.1%	10.5%	9.3%	20.0%	28.6%	14.6%	13.5%	—
	3回目接種後	18.8%	11.1%	33.3%	25.0%	—	20.0%	10.5%	17.4%	8.3%	10.0%	15.4%	11.7%	15.4%	19.4%
その他	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	7.7%	—	—	—	2.4%	1.9%	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7%	—	—	1.9%	1.2%	—
	3回目接種後	—	2.8%	—	—	—	1.1%	—	—	2.8%	5.0%	—	1.8%	1.5%	1.4%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5%	—	—	2.4%	1.9%	—
	2回目接種後	5.0%	4.8%	—	—	—	3.0%	—	—	4.7%	—	—	1.9%	2.4%	—
	3回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	4.3%	—	5.0%	—	1.8%	1.0%	—
受診しなかった	1回目接種後	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87.5%	100%	100%	97.6%	98.1%	—
	2回目接種後	95.0%	95.2%	100%	100%	100%	97.0%	100%	100%	95.3%	100%	100%	98.1%	97.6%	—
	3回目接種後	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	95.7%	100%	95.0%	100%	98.2%	99.0%	100%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100%	66.7%	100%	100%	50.0%	83.3%	87.5%	69.2%	75.0%	75.0%	75.0%	75.6%	77.4%	—
	2回目接種後	45.0%	52.4%	52.9%	62.5%	100%	52.2%	52.6%	63.2%	46.5%	60.0%	57.1%	53.4%	52.9%	—
	3回目接種後	37.5%	22.2%	47.6%	43.8%	100.0%	35.6%	47.4%	30.4%	47.2%	55.0%	76.9%	48.6%	42.8%	25.0%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目接種後	—	33.3%	—	—	50.0%	16.7%	12.5%	30.8%	25.0%	25.0%	25.0%	24.4%	22.6%	—
	2回目接種後	55.0%	47.6%	47.1%	37.5%	—	47.8%	47.4%	36.8%	53.5%	40.0%	42.9%	46.6%	47.1%	—
	3回目接種後	62.5%	77.8%	52.4%	56.3%	—	64.4%	52.6%	69.6%	52.8%	45.0%	23.1%	51.4%	57.2%	75.0%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。		男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
		(11名)	(14名)	(9名)	(5名)	(0名)	(39名)	(12名)	(14名)	(28名)	(12名)	(8名)	(74名)	(113名)	(25名)
2回目よりも症状が重かったと思う		54.5%	35.7%	33.3%	80.0%	—	46.2%	41.7%	35.7%	42.9%	16.7%	25.0%	35.1%	38.9%	56.0%
2回目よりも症状が軽かったと思う		9.1%	28.6%	22.2%	20.0%	—	20.5%	33.3%	42.9%	21.4%	16.7%	12.5%	25.7%	23.9%	12.0%
2回目と同じ程度だったと思う		36.4%	35.7%	44.4%	—	—	33.3%	25.0%	21.4%	35.7%	66.7%	62.5%	39.2%	37.2%	32.0%

(8) その他(吐き気、リンパの腫れ・痛み、悪寒、下痢など)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。		男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
	1回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(2名)	(3名)	(8名)	(2名)	(0名)	(15名)	(16名)	—
	2回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(3名)	(2名)	(1名)	(0名)	(7名)	(6名)	(6名)	(11名)	(5名)	(2名)	(30名)	(37名)	—
	3回目接種後の年代別回答者数	(5名)	(3名)	(3名)	(5名)	(0名)	(16名)	(7名)	(15名)	(14名)	(14名)	(2名)	(52名)	(68名)	(14名)
接種日のみ	1回目接種後	100%	—	—	—	—	100%	50.0%	33.3%	25.0%	—	—	26.7%	31.3%	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1%	7.1%	—	3.8%	2.9%	—
接種日から翌日まで	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5%	50.0%	—	13.3%	12.5%	—
	2回目接種後	—	—	50.0%	—	—	14.3%	50.0%	16.7%	18.2%	20.0%	—	23.3%	21.6%	—
	3回目接種後	—	—	—	—	—	—	14.3%	6.7%	14.3%	14.3%	—	11.5%	8.8%	7.1%
接種日から翌々日まで	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	50.0%	—	25.0%	50.0%	—	26.7%	25.0%	—
	2回目接種後	—	33.3%	—	—	—	14.3%	—	—	27.3%	20.0%	50.0%	16.7%	16.2%	—
	3回目接種後	40.0%	33.3%	—	20.0%	—	25.0%	14.3%	33.3%	42.9%	28.6%	—	30.8%	29.4%	28.6%
接種日の翌日のみ	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0%	—	—	13.3%	12.5%	—
	2回目接種後	—	66.7%	50.0%	—	—	42.9%	—	—	36.4%	40.0%	50.0%	23.3%	27.0%	—
	3回目接種後	40.0%	33.3%	33.3%	40.0%	—	37.5%	—	13.3%	7.1%	7.1%	—	7.7%	14.7%	28.6%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	33.3%	—	—	—	6.7%	6.3%	—
	2回目接種後	—	—	—	100%	—	14.3%	50.0%	50.0%	—	—	—	20.0%	18.9%	—
	3回目接種後	—	33.3%	—	20.0%	—	12.5%	42.9%	20.0%	14.3%	7.1%	100%	21.2%	19.1%	21.4%
その他(数日間続いた等)	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	33.3%	12.5%	—	—	13.3%	12.5%	—
	2回目接種後	100%	—	—	—	—	14.3%	—	33.3%	18.2%	20.0%	—	16.7%	16.2%	—
	3回目接種後	20.0%	—	66.7%	20.0%	—	25.0%	28.6%	26.7%	14.3%	35.7%	—	25.0%	25.0%	14.3%

②ピークはいつだったか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目接種後	100%	—	—	—	—	100%	50.0%	33.3%	25.0%	—	—	26.7%	31.3%	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	16.7%	9.1%	20.0%	—	10.0%	8.1%	—
	3回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1%	14.3%	—	5.8%	4.4%	—
接種日の翌日	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	50.0%	—	62.5%	100%	—	53.3%	50.0%	—
	2回目接種後	100%	100%	100%	100%	—	100%	83.3%	33.3%	54.5%	80.0%	50.0%	60.0%	67.6%	—
	3回目接種後	100%	67%	33.3%	100%	—	81.3%	71.4%	60.0%	64.3%	42.9%	100%	59.6%	64.7%	64.3%
接種日の翌々日	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	33.3%	12.5%	—	—	13.3%	12.5%	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	16.7%	16.7%	18.2%	—	50.0%	16.7%	13.5%	—
	3回目接種後	—	33.3%	66.7%	—	—	18.8%	14.3%	26.7%	28.6%	35.7%	—	26.9%	25.0%	28.6%
その他	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	33.3%	—	—	—	6.7%	6.3%	—
	2回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	33.3%	18.2%	—	—	13.3%	10.8%	—
	3回目接種後	—	—	—	—	—	—	14.3%	13.3%	—	7.1%	—	7.7%	5.9%	7.1%

③病院を受診したか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	—	33.3%	12.5%	—	—	13.3%	12.5%	—
	2回目接種後	—	33.3%	—	—	—	14.3%	—	16.7%	18.2%	—	—	10.0%	10.8%	—
	3回目接種後	—	—	33.3%	—	—	6.3%	—	6.7%	—	7.1%	—	3.8%	4.4%	—
受診しなかった	1回目接種後	100%	—	—	—	—	100%	100%	66.7%	87.5%	100%	—	86.7%	87.5%	—
	2回目接種後	100%	66.7%	100%	100%	—	85.7%	100%	83.3%	81.8%	100%	100%	90.0%	89.2%	—
	3回目接種後	100%	100%	66.7%	100%	—	93.8%	100%	93.3%	100%	92.9%	100%	96.2%	95.6%	100%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。		男性						女性						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目接種後	100%	—	—	—	—	100%	50.0%	66.7%	75.0%	50.0%	—	66.7%	68.8%	—
	2回目接種後	100%	—	50.0%	100%	—	42.9%	33.3%	50.0%	54.5%	40.0%	50.0%	46.7%	45.9%	—
	3回目接種後	20.0%	100%	66.7%	40.0%	—	50.0%	28.6%	40.0%	42.9%	71.4%	50.0%	48.1%	48.5%	28.6%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目接種後	—	—	—	—	—	—	50.0%	33.3%	25.0%	50.0%	—	33.3%	31.3%	—
	2回目接種後	—	100%	50.0%	—	—	57.1%	66.7%	50.0%	45.5%	60.0%	50.0%	53.3%	54.1%	—
	3回目接種後	80.0%	—	33.3%	60.0%	—	50.0%	71.4%	60.0%	57.1%	28.6%	50.0%	51.9%	51.5%	71.4%

⑤2回目接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうか。		男性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(2回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
		(2名)	(2名)	(0名)	(0名)	(0名)	(4名)	(2名)	(5名)	(3名)	(2名)	(2名)	(14名)	(18名)	(2名)
2回目よりも症状が重かったと思う		—	—	—	—	—	—	50.0%	60.0%	33.3%	100%	100%	64.3%	50.0%	50.0%
2回目よりも症状が軽かったと思う		—	50.0%	—	—	—	25.0%	—	20.0%	33.3%	—	—	14.3%	16.7%	50.0%
2回目と同じ程度だったと思う		100%	50%	—	—	—	75%	50.0%	20.0%	33.3%	—	—	21.4%	33.3%	—

【参考】その他の副反応症状のうち回答が多かった上位3つの副反応発症人数		男性(3回目接種後にその他の副反応があった人数)						女性(3回目接種後にその他の副反応があった人数)						男女計	【参考】 モデルナ接種者割合
		～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
		(5名)	(3名)	(3名)	(5名)	(0名)	(16名)	(7名)	(15名)	(14名)	(14名)	(2名)	(52名)	(68名)	(14名)
①「嘔吐・吐き気」があったと回答した方		60%	—	—	20%	—	25%	57%	60%	29%	21%	—	38%	35%	21%
		3	—	—	1	—	4	4	9	4	3	—	20	24	3
②「リンパの腫れ・痛み」があったと回答した方		—	33%	67%	—	—	19%	43%	27%	36%	50%	—	37%	32%	21%
		—	1	2	—	—	3	3	4	5	7	—	19	22	3
③「悪寒・寒気」があったと回答した方		40%	—	33%	20%	—	25%	14%	20%	36%	21%	—	23%	24%	50%
		2	—	1	1	—	4	1	3	5	3	—	12	16	7

※その他の副反応があったと回答した方は68名いますが、一人で複数のその他の副反応が発症した方もいるため年代別の回答者数とは一致しません。