


【相馬市】医療従事者・市職員における新型コロナワクチン(オミクロン株対応)接種後の副反応発症状況

1. 副反応ごとの発症割合グラフ(下表の「男女全体の発症割合/数」の率)





※ P・M ■ P : オミクロン株ワクチン接種のうち、ファイザー社製ワクチン接種者344名の副反応発症割合(全年代の合計値)  
 ■ M : オミクロン株ワクチン接種のうち、モデルナ社製ワクチン接種者31名の副反応発症割合(全年代の合計値)

◎接種後における副反応別のアンケート結果(複数回答)

主な副反応の区分	男性						女性						男女全体の発症割合/数	ワクチン別発症割合/数		
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		ファイザー(P)	モデルナ(M)	
(1)接種部位の痛み(腫れ、かゆみ含む)	1回目接種後	37	73	59	52	19	240	45	52	86	47	18	248	488	-	-
	2回目接種後	37	73	56	47	18	231	43	60	86	47	17	243	474	-	-
	3回目接種後	26	77	57	52	20	232	33	37	74	50	33	227	459	312	147
	オミクロン株対応ワクチン接種後	18	57	43	48	23	189	27	25	67	38	29	186	375	344	31
	オミクロン株対応ワクチン接種後	86%	89%	90%	79%	68%	85%	87%	90%	83%	83%	78%	85%	85%	-	-
(2)発熱(37.5°C以上)	1回目接種後	3	1	2	2	0	2	7	2	2	0	11	3	2	-	-
	2回目接種後	25	41	30	23	6	84	22	60	47	34	16	111	195	-	-
	3回目接種後	18	41	29	37	10	109	11	24	21	15	8	79	188	99	89
	オミクロン株対応ワクチン接種後	9	15	6	13	20	41	6	24	18	18	6	39	80	75	5
	オミクロン株対応ワクチン接種後	35%	19%	11%	13%	20%	18%	18%	24%	18%	18%	6%	17%	17%	22%	16%
(3)発熱(37.5°C未満)	1回目接種後	0	5	0	4	5	3	11	8	6	6	6	7	5	-	-
	2回目接種後	11	22	25	26	11	21	21	8	14	11	24	14	17	-	-
	3回目接種後	4	16	14	19	2	48	9	4	12	5	4	34	82	-	-
	オミクロン株対応ワクチン接種後	6	13	8	10	5	42	9	3	18	7	4	41	83	75	8
	オミクロン株対応ワクチン接種後	23%	17%	14%	19%	25%	18%	27%	8%	24%	14%	12%	18%	18%	22%	26%
(4)倦怠感(だるさ、疲れなど)	1回目接種後	24	18	8	17	11	16	36	29	20	15	17	23	20	-	-
	2回目接種後	78	56	52	55	17	55	67	56	69	53	65	63	59	-	-
	3回目接種後	20	53	36	62	32	145	21	23	42	19	19	124	269	170	99
	オミクロン株対応ワクチン接種後	14	34	22	23	10	103	13	14	34	24	9	94	197	182	15
	オミクロン株対応ワクチン接種後	54%	44%	39%	44%	50%	44%	39%	38%	46%	48%	27%	41%	43%	53%	48%
(5)関節や筋肉の痛み(接種部位除く)	1回目接種後	16	10	7	8	5	9	16	17	8	15	22	14	11	-	-
	2回目接種後	57	32	21	32	17	32	51	36	33	30	29	36	34	-	-
	3回目接種後	21	23	12	15	3	74	22	18	28	14	5	87	161	-	-
	オミクロン株対応ワクチン接種後	14	30	31	20	3	98	21	19	38	32	16	97	195	122	73
	オミクロン株対応ワクチン接種後	38%	17%	14%	23%	15%	20%	27%	22%	22%	20%	9%	20%	20%	24%	32%
(6)めまい	1回目接種後	0	1	0	0	0	1	1	4	2	0	0	7	8	-	-
	2回目接種後	14	4	5	4	0	6	16	8	8	0	12	8	7	-	-
	3回目接種後	5	3	3	2	0	13	7	4	7	0	2	20	33	-	-
	オミクロン株対応ワクチン接種後	4	2	1	1	0	8	0	0	2	0	0	2	10	10	0
	オミクロン株対応ワクチン接種後	15%	3%	2%	2%	0%	3%	0%	0%	3%	0%	0%	1%	2%	3%	0%
(7)頭痛	1回目接種後	5	4	5	4	11	5	18	25	9	17	22	17	11	-	-
	2回目接種後	54	29	30	17	6	29	44	38	50	32	41	42	36	-	-
	3回目接種後	20	21	17	8	1	67	19	19	43	15	7	103	170	-	-
	オミクロン株対応ワクチン接種後	16	36	21	16	1	90	19	23	36	20	13	111	201	129	72
	オミクロン株対応ワクチン接種後	38%	19%	18%	13%	20%	20%	27%	32%	28%	20%	21%	26%	23%	29%	19%
(8)その他(吐き気、リンパの腫れ・痛み、悪寒、下痢など)	1回目接種後	3	0	0	0	0	0	4	6	9	4	0	6	3	-	-
	2回目接種後	3	4	4	2	0	3	14	12	13	11	12	12	8	-	-
	3回目接種後	1	3	2	1	0	7	6	6	11	5	2	30	37	-	-
	オミクロン株対応ワクチン接種後	5	3	3	5	0	16	7	15	14	14	2	52	68	54	14
	オミクロン株対応ワクチン接種後	4%	3%	2%	2%	0%	2%	6%	3%	7%	6%	6%	6%	4%	4%	13%
(9)特に何もなかった	1回目接種後	5	1	5	10	0	5	2	0	3	0	0	2	3	-	-
	2回目接種後	0	1	0	6	0	2	0	2	2	4	0	2	1	-	-
	3回目接種後	8	3	0	2	25	4	6	3	3	4	12	5	5	-	-
	オミクロン株対応ワクチン接種後	2	2	0	1	5	10	2	1	2	2	4	11	21	18	3
	オミクロン株対応ワクチン接種後	0%	1%	4%	10%	10%	4%	6%	3%	5%	2%	3%	4%	4%	4%	16%

## 2. 接種後の副反応ごとの状況について

### (1) 接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の発症割合グラフ(下表①と⑤の男女計)



### ◎接種部位の痛み(腫れ・かゆみ含む)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(32名)	(65名)	(53名)	(41名)	(13名)	(204名)	(39名)	(47名)	(71名)	(39名)	(14名)	(210名)	(414名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(28名)	(58名)	(48名)	(27名)	(13名)	(174名)	(32名)	(38名)	(58名)	(32名)	(13名)	(173名)	(347名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(22名)	(70名)	(49名)	(43名)	(15名)	(199名)	(28名)	(34名)	(64名)	(44名)	(26名)	(196名)	(395名)	
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(17名)	(51名)	(31名)	(37名)	(20名)	(156名)	(22名)	(22名)	(55名)	(33名)	(23名)	(155名)	(311名)	
接種日のみ	1回目	-	-	-	2.4%	0.5%	2.6%	-	-	-	-	-	0.5%	0.5%
	2回目	-	1.7%	-	-	7.7%	1.1%	-	2.6%	1.7%	6.3%	-	2.3%	1.7%
	3回目	-	-	-	-	6.7%	0.5%	-	2.9%	-	-	-	0.5%	0.5%
	オミクロン株	-	2.0%	-	-	-	0.6%	-	-	1.8%	-	-	0.6%	0.6%
接種日から翌日まで	1回目	37.5%	30.8%	37.7%	31.7%	15.4%	32.8%	28.2%	23.4%	29.6%	30.8%	28.6%	28.1%	30.4%
	2回目	32.1%	27.6%	35.4%	37.0%	38.5%	32.8%	50.0%	34.2%	27.6%	31.3%	23.1%	33.5%	33.1%
	3回目	13.6%	15.7%	14.3%	23.3%	13.3%	16.6%	21.4%	17.6%	12.5%	15.9%	11.5%	15.3%	15.9%
	オミクロン株	35.3%	35.3%	12.9%	27.0%	30.0%	28.2%	22.7%	13.6%	20.0%	24.2%	21.7%	20.6%	24.4%
接種日から翌々日まで	1回目	34.4%	47.7%	45.3%	31.7%	61.5%	42.6%	51.3%	55.3%	46.5%	38.5%	50.0%	48.1%	45.4%
	2回目	35.7%	43.1%	41.7%	33.3%	46.2%	40.2%	37.5%	47.4%	46.6%	37.5%	53.8%	43.9%	42.1%
	3回目	54.5%	51.4%	40.8%	53.5%	40.0%	48.7%	39.3%	38.2%	50.0%	38.6%	50.0%	43.9%	46.3%
	オミクロン株	64.7%	45.1%	71.0%	48.6%	50.0%	53.8%	45.5%	59.1%	52.7%	54.5%	47.8%	52.3%	53.1%
接種日の翌日のみ	1回目	9.4%	6.2%	9.4%	22.0%	7.7%	10.8%	5.1%	2.1%	4.2%	5.1%	7.1%	4.3%	7.5%
	2回目	10.7%	10.3%	16.7%	18.5%	-	12.6%	3.1%	2.6%	5.2%	-	7.7%	3.5%	8.1%
	3回目	4.5%	2.9%	-	2.3%	-	2.0%	-	2.9%	3.1%	-	-	1.5%	1.8%
	オミクロン株	-	2.0%	3.2%	5.4%	-	2.6%	4.5%	9.1%	-	-	-	1.9%	2.3%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	15.6%	13.8%	7.5%	12.2%	15.4%	12.3%	12.8%	19.1%	12.7%	15.4%	14.3%	14.8%	13.5%
	2回目	17.9%	15.5%	6.3%	11.1%	7.7%	12.1%	9.4%	13.2%	13.8%	12.5%	7.7%	12.1%	12.1%
	3回目	13.6%	20.0%	36.7%	14.0%	33.3%	23.1%	25.0%	23.5%	26.6%	27.3%	30.8%	26.5%	24.8%
	オミクロン株	-	7.8%	12.9%	18.9%	20.0%	12.2%	18.2%	13.6%	20.0%	12.1%	17.4%	16.8%	14.5%
その他(数日間続いた等)	1回目	3.1%	1.5%	-	-	-	1.0%	-	-	7.0%	10.3%	-	4.3%	2.7%
	2回目	3.6%	1.7%	-	-	-	1.1%	-	-	5.2%	12.5%	7.7%	4.6%	2.9%
	3回目	13.6%	10.0%	8.2%	7.0%	6.7%	9.0%	14.3%	14.7%	7.8%	18.2%	7.7%	12.2%	10.6%
	オミクロン株	-	7.8%	-	-	-	2.6%	9.1%	4.5%	5.5%	9.1%	13.0%	7.7%	5.1%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目	3.1%	9.2%	9.4%	9.8%	15.4%	8.8%	12.8%	12.8%	11.3%	17.9%	14.3%	13.3%	11.1%
	2回目	3.6%	8.6%	4.2%	3.7%	7.7%	5.7%	9.4%	7.9%	3.4%	21.9%	7.7%	9.2%	7.5%
	3回目	4.5%	2.9%	2.0%	7.0%	13.3%	4.5%	7.1%	8.8%	6.3%	11.4%	11.5%	8.7%	6.6%
	オミクロン株	-	5.9%	-	10.8%	10.0%	5.8%	4.5%	4.5%	10.9%	6.1%	4.3%	7.1%	6.4%
接種日の翌日	1回目	93.8%	90.8%	88.7%	90.2%	84.6%	90.2%	87.2%	87.2%	83.1%	76.9%	85.7%	83.8%	87.0%
	2回目	89.3%	89.7%	89.6%	88.9%	84.6%	89.1%	81.3%	84.2%	86.2%	68.8%	61.5%	79.8%	84.4%
	3回目	95.5%	90.0%	79.6%	83.7%	80.0%	85.9%	89.3%	88.2%	85.9%	77.3%	76.9%	83.7%	84.8%
	オミクロン株	100%	94.1%	100%	89.2%	90.0%	94.2%	95.5%	90.9%	81.8%	84.8%	82.6%	85.8%	90.0%
接種日の翌々日	1回目	3.1%	-	1.9%	-	-	1.0%	-	-	5.6%	2.6%	-	2.4%	1.7%
	2回目	7.1%	-	6.3%	7.4%	7.7%	4.6%	9.4%	7.9%	10.3%	6.3%	23.1%	9.8%	7.2%
	3回目	-	7.1%	14.3%	9.3%	6.7%	8.5%	3.6%	2.9%	7.8%	9.1%	11.5%	7.1%	7.8%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	4.5%	5.5%	9.1%	13.0%	6.5%	3.2%
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6%	-	0.5%	0.2%
	2回目	-	1.7%	-	-	-	0.6%	-	-	-	3.1%	7.7%	1.2%	0.9%
	3回目	-	-	4.1%	-	-	1.0%	-	-	-	2.3%	-	0.5%	0.8%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8%	-	-	0.6%	0.3%



③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	-	2.1%	-	-	-	0.5%	0.2%
	2回目	-	1.7%	2.1%	-	7.7%	1.7%	-	2.6%	1.7%	-	-	1.2%	1.4%
	3回目	-	1.4%	-	-	-	0.5%	-	-	1.6%	-	-	0.5%	0.5%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0%	-	0.6%	0.3%
受診しなかった	1回目	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.9%	100%	100%	100%	99.5%	99.8%
	2回目	100%	98.3%	97.9%	100%	92.3%	98.3%	100%	97.4%	98.3%	100%	100%	98.8%	98.6%
	3回目	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.5%	100%	100%	98.4%	100%	100%	99.5%	99.5%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.0%	100%	99.4%	99.7%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	93.8%	100%	100%	100%	92.3%	98.5%	89.7%	93.6%	95.8%	100%	92.9%	94.8%	96.6%
	2回目	89.3%	87.9%	89.6%	96.3%	92.3%	90.2%	90.6%	86.8%	86.2%	93.8%	84.6%	88.4%	89.3%
	3回目	72.7%	80.0%	81.6%	81.4%	86.7%	80.4%	71.4%	82.4%	79.7%	79.5%	88.5%	80.1%	80.3%
	オミクロン株	64.7%	86.3%	93.5%	89.2%	85.0%	85.9%	90.9%	86.4%	85.5%	81.8%	95.7%	87.1%	86.5%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	6.3%	-	-	-	7.7%	1.5%	10.3%	6.4%	4.2%	-	7.1%	5.2%	3.4%
	2回目	10.7%	12.1%	10.4%	3.7%	7.7%	9.8%	9.4%	13.2%	13.8%	6.3%	15.4%	11.6%	10.7%
	3回目	27.3%	20.0%	18.4%	18.6%	13.3%	19.6%	28.6%	17.6%	20.3%	20.5%	11.5%	19.9%	19.7%
	オミクロン株	35.3%	13.7%	6.5%	10.8%	15.0%	14.1%	9.1%	13.6%	14.5%	18.2%	4.3%	12.9%	13.5%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
	(17名)	(51名)	(31名)	(35名)	(18名)	(152名)	(22名)	(21名)	(53名)	(33名)	(20名)	(149名)	(301名)
前回よりも症状が重かったと思う	23.5%	13.7%	6.5%	5.7%	16.7%	11.8%	4.5%	19.0%	7.5%	27.3%	20.0%	14.8%	13.3%
前回よりも症状が軽かったと思う	35.3%	41.2%	29.0%	42.9%	38.9%	38.2%	54.5%	52.4%	43.4%	36.4%	55.0%	46.3%	42.2%
前回と同じ程度だったと思う	41.2%	45.1%	64.5%	51.4%	44.4%	50.0%	40.9%	28.6%	49.1%	36.4%	25.0%	38.9%	44.5%



(2) 発熱(37.5℃以上)の発症割合グラフ(下表①と⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃以上)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(1名)	(1名)	(1名)	(0名)	(4名)	(3名)	(1名)	(2名)	(0名)	(2名)	(8名)	(12名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(25名)	(30名)	(17名)	(11名)	(1名)	(84名)	(22名)	(30名)	(40名)	(16名)	(3名)	(111名)	(195名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(18名)	(41名)	(29名)	(19名)	(2名)	(109名)	(11名)	(24名)	(21名)	(15名)	(8名)	(79名)	(188名)	
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(9名)	(15名)	(6名)	(7名)	(4名)	(41名)	(6名)	(9名)	(13名)	(9名)	(2名)	(39名)	(80名)	
接種日のみ	1回目	-	-	-	-	-	33.3%	-	50.0%	-	-	25.0%	16.7%	
	2回目	-	-	-	-	-	-	3.3%	2.5%	-	-	1.8%	1.0%	
	3回目	5.6%	-	-	-	-	-	8.3%	-	-	-	2.5%	1.6%	
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接種日から翌日まで	1回目	-	-	-	-	-	66.7%	-	50.0%	-	50.0%	50.0%	33.3%	
	2回目	24.0%	16.7%	47.1%	36.4%	-	22.7%	26.7%	12.5%	18.8%	33.3%	19.8%	23.1%	
	3回目	22.2%	19.5%	20.7%	15.8%	50%	36.4%	25.0%	23.8%	20.0%	12.5%	24.1%	21.8%	
	オミクロン株	33.3%	46.7%	16.7%	42.9%	25.0%	36.6%	50.0%	33.3%	30.8%	11.1%	-	28.2%	32.5%
接種日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2回目	12.0%	6.7%	11.8%	9.1%	-	13.6%	20.0%	15.0%	12.5%	33.3%	16.2%	13.3%	
	3回目	5.6%	12.2%	10.3%	15.8%	-	-	25.0%	19.0%	26.7%	12.5%	19.0%	14.4%	
	オミクロン株	11.1%	13.3%	-	-	-	7.3%	-	22.2%	15.4%	44.4%	-	20.5%	13.8%
接種日の翌日のみ	1回目	100%	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	
	2回目	52.0%	63.3%	35.3%	27.3%	100%	50.0%	45.5%	43.3%	55.0%	43.8%	33.3%	47.7%	48.7%
	3回目	50.0%	48.8%	27.6%	31.6%	-	39.4%	45.5%	16.7%	38.1%	40.0%	37.5%	32.9%	36.7%
	オミクロン株	44.4%	26.7%	66.7%	57.1%	75.0%	46.3%	16.7%	33.3%	46.2%	33.3%	100%	38.5%	42.5%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	12.5%	8.3%
	2回目	12.0%	13.3%	5.9%	27.3%	-	13.1%	13.6%	6.7%	15.0%	25.0%	-	13.5%	13.3%
	3回目	16.7%	19.5%	41.4%	36.8%	50.0%	28.4%	18.2%	25.0%	19.0%	13.3%	37.5%	21.5%	25.5%
	オミクロン株	11.1%	13.3%	16.7%	-	-	9.8%	33.3%	11.1%	-	11.1%	-	10.3%	10.0%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	100%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	50.0%	12.5%	16.7%
	2回目	-	-	-	-	-	-	4.5%	-	-	-	-	0.9%	0.5%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7%	-	-	2.6%	1.3%



②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
接種当日	1回目	-	-	-	-	-	33.3%	-	50.0%	-	-	25.0%	16.7%	
	2回目	-	-	5.9%	-	-	-	3.3%	5.0%	6.3%	-	3.6%	2.6%	
	3回目	5.6%	-	-	5.3%	-	9.1%	4.2%	-	-	-	2.5%	2.1%	
	オミクロン株	-	13.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5%	
接種日の翌日	1回目	100%	-	100%	100%	-	75.0%	66.7%	100%	50.0%	-	50.0%	62.5%	66.7%
	2回目	92.0%	100%	82.4%	100%	100%	94.0%	95.5%	96.7%	95.0%	81.3%	100%	93.7%	93.8%
	3回目	94%	98%	79.3%	94.7%	100%	91.7%	90.9%	95.8%	95.2%	93.3%	87.5%	93.7%	92.6%
	オミクロン株	100%	86.7%	100%	100%	100%	95.1%	83.3%	88.9%	100%	100%	100%	94.9%	95.0%
接種日の翌々日	1回目	-	100%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	8.3%
	2回目	8.0%	-	11.8%	-	-	4.8%	4.5%	-	-	12.5%	-	2.7%	3.6%
	3回目	-	2.4%	20.7%	-	-	6.4%	-	-	4.8%	6.7%	12.5%	3.8%	5.3%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	16.7%	11.1%	-	-	-	5.1%	2.5%
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	12.5%	8.3%
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
受診した	1回目	-	100%	-	-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	8.3%
	2回目	4.0%	6.7%	-	-	-	3.6%	4.5%	6.7%	7.5%	-	-	5.4%	4.6%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目	100%	-	100%	100%	-	75.0%	100%	100%	100%	-	100%	100%	91.7%
	2回目	96.0%	93.3%	100%	100%	100%	96.4%	95.5%	93.3%	92.5%	100%	100%	94.6%	95.4%
	3回目	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	-	-	100%	-	-	25.0%	33.3%	-	100%	-	50.0%	50.0%	41.7%
	2回目	28.0%	16.7%	29.4%	27.3%	-	23.8%	22.7%	23.3%	32.5%	43.8%	66.7%	30.6%	27.7%
	3回目	22.2%	17.1%	10.3%	21.1%	-	16.5%	18.2%	20.8%	9.5%	26.7%	37.5%	20.3%	18.1%
	オミクロン株	11.1%	26.7%	33.3%	28.6%	-	22.0%	50.0%	33.3%	15.4%	22.2%	50.0%	28.2%	25.0%
高熱により、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	100%	100%	-	100%	-	75.0%	66.7%	100%	-	-	50.0%	50.0%	58.3%
	2回目	72.0%	83.3%	70.6%	72.7%	100%	76.2%	77.3%	76.7%	67.5%	56.3%	33.3%	69.4%	72.3%
	3回目	77.8%	82.9%	89.7%	78.9%	100%	83.5%	81.8%	79.2%	90.5%	73.3%	62.5%	79.7%	81.9%
	オミクロン株	88.9%	73.3%	66.7%	71.4%	100%	78.0%	50.0%	66.7%	84.6%	77.8%	50.0%	71.8%	75.0%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
前回よりも症状が重かったと思う	(7名)	(15名)	(5名)	(6名)	(3名)	(36名)	(6名)	(7名)	(13名)	(9名)	(2名)	(37名)	(73名)
前回よりも症状が軽かったと思う	28.6%	33.3%	-	-	-	19.4%	-	14.3%	7.7%	33.3%	50.0%	16.2%	17.8%
前回と同じ程度だったと思う	42.9%	33.3%	40.0%	50.0%	100%	44.4%	100%	71.4%	30.8%	22.2%	50.0%	48.6%	46.6%
前回と同じ程度だったと思う	28.6%	33.3%	60.0%	50.0%	-	36.1%	-	14.3%	61.5%	44.4%	-	35.1%	35.6%

(3) 発熱(37.5℃未満)の発症割合グラフ(下表①と⑤の男女計)



◎発熱(37.5℃未満)の症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(4名)	(0名)	(2名)	(1名)	(7名)	(5名)	(4名)	(5名)	(3名)	(1名)	(18名)	(25名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(16名)	(14名)	(12名)	(2名)	(48名)	(9名)	(4名)	(12名)	(5名)	(4名)	(34名)	(82名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(14名)	(14名)	(10名)	(4名)	(46名)	(11名)	(5名)	(19名)	(6名)	(2名)	(43名)	(89名)	
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(6名)	(13名)	(8名)	(10名)	(5名)	(42名)	(9名)	(3名)	(18名)	(7名)	(4名)	(41名)	(83名)	
接種日のみ	1回目	-	-	-	-	-	20.0%	25.0%	20.0%	-	-	16.7%	12.0%	
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	50.0%	8.8%	3.7%	
	3回目	-	7.1%	-	-	-	2.2%	-	-	-	-	-	1.1%	
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接種日から翌日まで	1回目	-	50.0%	-	50.0%	100%	57.1%	60.0%	25.0%	40.0%	33.3%	-	38.9%	44.0%
	2回目	25.0%	31.3%	28.6%	16.7%	-	25.0%	55.6%	75.0%	66.7%	-	25.0%	50.0%	35.4%
	3回目	25.0%	28.6%	42.9%	20.0%	-	28.3%	27.3%	20.0%	52.6%	50.0%	100%	44.2%	36.0%
	オミクロン株	33.3%	38.5%	25.0%	10.0%	80.0%	33.3%	66.7%	-	38.9%	42.9%	50.0%	43.9%	38.6%
接種日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7%	100%	16.7%	12.0%
	2回目	-	-	21.4%	8.3%	-	8.3%	-	-	-	20.0%	-	2.9%	6.1%
	3回目	-	7.1%	7.1%	10.0%	50.0%	10.9%	-	20.0%	5.3%	16.7%	-	7.0%	9.0%
	オミクロン株	16.7%	7.7%	-	20.0%	-	9.5%	-	33.3%	5.6%	28.6%	-	9.8%	9.6%
接種日の翌日のみ	1回目	-	50.0%	-	-	-	28.6%	20.0%	50.0%	40.0%	-	-	27.8%	28.0%
	2回目	75.0%	68.8%	50.0%	58.3%	100%	62.5%	11.1%	25.0%	33.3%	40.0%	25.0%	26.5%	47.6%
	3回目	25.0%	50.0%	35.7%	40.0%	25.0%	39.1%	45.5%	60.0%	42.1%	33.3%	-	41.9%	40.4%
	オミクロン株	33.3%	38.5%	62.5%	50.0%	20.0%	42.9%	33.3%	66.7%	33.3%	14.3%	50.0%	34.1%	38.6%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	-	-	-	50.0%	-	14.3%	-	-	-	-	-	-	4.0%
	2回目	-	-	-	8.3%	-	2.1%	33.3%	-	-	20.0%	-	11.8%	6.1%
	3回目	50.0%	7.1%	14.3%	30.0%	25.0%	19.6%	18.2%	-	-	-	-	4.7%	12.4%
	オミクロン株	16.7%	15.4%	12.5%	20.0%	-	14.3%	-	-	22.2%	14.3%	-	12.2%	13.3%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目	-	-	-	8.3%	-	2.1%	-	-	-	-	-	-	1.2%
	3回目	-	-	-	-	-	-	9.1%	-	-	-	-	2.3%	1.1%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目	-	-	-	-	-	-	40.0%	25.0%	20.0%	-	-	22.2%	16.0%
	2回目	-	6.3%	-	-	-	2.1%	-	-	-	20.0%	50.0%	8.8%	4.9%
	3回目	-	7.1%	7.1%	10.0%	-	6.5%	-	-	10.5%	16.7%	-	7.0%	6.7%
	オミクロン株	-	-	12.5%	-	-	2.4%	-	-	-	-	-	-	1.2%
接種日の翌日	1回目	-	100%	-	100%	100%	100%	60.0%	75.0%	80.0%	66.7%	100%	72.2%	80.0%
	2回目	100%	93.8%	100%	100%	100%	97.9%	88.9%	100%	100%	40.0%	50.0%	82.4%	91.5%
	3回目	75.0%	85.7%	78.6%	70.0%	75.0%	78.3%	81.8%	100%	84.2%	66.7%	100%	83.7%	80.9%
	オミクロン株	100%	92.3%	87.5%	100%	100%	95.2%	100%	100%	94.4%	100%	100%	97.6%	96.4%
接種日の翌々日	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	5.6%	4.0%
	2回目	-	-	-	-	-	-	11.1%	-	-	40.0%	-	8.8%	3.7%
	3回目	25.0%	7.1%	7.1%	20.0%	25.0%	13.0%	18.2%	-	-	16.7%	-	7.0%	10.1%
	オミクロン株	-	7.7%	-	-	-	2.4%	-	-	5.6%	-	-	2.4%	2.4%
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目	-	-	7.1%	-	-	2.2%	-	-	5.3%	-	-	2.3%	2.2%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	100%	11.1%	8.0%
	2回目	-	-	-	8.3%	-	2.1%	22.2%	-	-	-	-	5.9%	3.7%
	3回目	-	-	-	-	-	-	9.1%	-	-	-	-	2.3%	1.1%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	2.4%	1.2%
受診しなかった	1回目	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	80.0%	100%	-	88.9%	92.0%
	2回目	100%	100%	100%	91.7%	100%	97.9%	77.8%	100%	100%	100%	100%	94.1%	96.3%
	3回目	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.9%	100%	100%	100%	100%	97.7%	98.9%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75.0%	97.6%	98.8%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	-	100%	-	100%	-	85.7%	80.0%	50.0%	80.0%	33.3%	100%	66.7%	72.0%
	2回目	50.0%	81.3%	85.7%	66.7%	50.0%	75.0%	66.7%	75.0%	66.7%	60.0%	75.0%	67.6%	72.0%
	3回目	25.0%	57.1%	78.6%	70.0%	75.0%	65.2%	45.5%	100%	52.6%	83.3%	50.0%	60.5%	62.9%
	オミクロン株	50.0%	46.2%	87.5%	50.0%	80.0%	59.5%	66.7%	66.7%	66.7%	71.4%	50.0%	65.9%	62.7%
発熱により、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	-	-	-	-	100%	14.3%	20.0%	50.0%	20.0%	66.7%	-	33.3%	28.0%
	2回目	50.0%	18.8%	14.3%	33.3%	50.0%	25.0%	33.3%	25.0%	33.3%	40.0%	25.0%	32.4%	28.0%
	3回目	75.0%	42.9%	21.4%	30.0%	25.0%	34.8%	54.5%	-	47.4%	16.7%	50.0%	39.5%	37.1%
	オミクロン株	50.0%	53.8%	12.5%	50.0%	20.0%	40.5%	33.3%	33.3%	33.3%	28.6%	50.0%	34.1%	37.3%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
前回よりも症状が重かったと思う	(2名)	(5名)	(2名)	(5名)	(4名)	(18名)	(0名)	(0名)	(4名)	(2名)	(1名)	(7名)	(25名)
前回よりも症状が軽かったと思う	50.0%	-	-	20.0%	25.0%	16.7%	-	-	-	-	-	-	12.0%
前回と同じ程度だったと思う	-	80.0%	-	20.0%	25.0%	33.3%	-	-	75.0%	50.0%	-	57.1%	40.0%
前回と同じ程度だったと思う	50.0%	20.0%	100%	60.0%	50.0%	50.0%	-	-	25.0%	50.0%	100%	42.9%	48.0%



◎倦怠感(だるさ、疲れなど)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(9名)	(13名)	(5名)	(9名)	(2名)	(38名)	(16名)	(15名)	(17名)	(7名)	(3名)	(58名)	(96名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(29名)	(41名)	(29名)	(26名)	(3名)	(128名)	(29名)	(28名)	(59名)	(25名)	(11名)	(152名)	(280名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(20名)	(53名)	(36名)	(32名)	(4名)	(145名)	(21名)	(23名)	(42名)	(19名)	(19名)	(124名)	(269名)	
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(14名)	(34名)	(22名)	(23名)	(10名)	(103名)	(13名)	(14名)	(34名)	(24名)	(9名)	(94名)	(197名)	
接種日のみ	1回目	11.1%	-	-	-	50.0%	5.3%	-	-	-	-	-	2.1%	
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0%	-	0.7%	
	3回目	5.0%	-	-	-	-	0.7%	-	4.3%	-	-	-	0.8%	
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接種日から翌日まで	1回目	44.4%	30.8%	20.0%	55.6%	-	36.8%	43.8%	46.7%	52.9%	-	-	39.7%	38.5%
	2回目	27.6%	24.4%	27.6%	26.9%	-	25.8%	34.5%	25.0%	20.3%	12.0%	27.3%	23.0%	24.3%
	3回目	20.0%	18.9%	16.7%	12.5%	-	16.6%	28.6%	17.4%	23.8%	21.1%	15.8%	21.8%	19.0%
	オミクロン株	50.0%	41.2%	50.0%	26.1%	10.0%	37.9%	38.5%	14.3%	29.4%	29.2%	11.1%	26.6%	32.5%
接種日から翌々日まで	1回目	11.1%	46.2%	40.0%	11.1%	50.0%	28.9%	43.8%	20.0%	29.4%	57.1%	66.7%	36.2%	33.3%
	2回目	17.2%	19.5%	31.0%	11.5%	33.3%	20.3%	31.0%	39.3%	30.5%	32.0%	27.3%	32.2%	26.8%
	3回目	30.0%	34.0%	16.7%	28.1%	75.0%	29.0%	23.8%	52.2%	33.3%	15.8%	42.1%	33.9%	31.2%
	オミクロン株	21.4%	14.7%	4.5%	39.1%	30.0%	20.4%	38.5%	50.0%	17.6%	50.0%	44.4%	36.2%	27.9%
接種日の翌日のみ	1回目	33.3%	23.1%	40.0%	11.1%	-	23.7%	-	6.7%	-	-	-	1.7%	10.4%
	2回目	34.5%	36.6%	27.6%	34.6%	-	32.8%	17.2%	10.7%	27.1%	16.0%	36.4%	21.1%	26.4%
	3回目	-	15.1%	19.4%	12.5%	-	13.1%	23.8%	13.0%	9.5%	5.3%	10.5%	12.1%	12.6%
	オミクロン株	21.4%	29.4%	27.3%	13.0%	30.0%	24.3%	15.4%	21.4%	17.6%	8.3%	33.3%	17.0%	20.8%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	-	-	-	22.2%	-	5.3%	12.5%	20.0%	17.6%	28.6%	33.3%	19.0%	13.5%
	2回目	13.8%	19.5%	13.8%	26.9%	66.7%	19.5%	17.2%	17.9%	18.6%	24.0%	-	17.8%	18.6%
	3回目	40.0%	32.1%	41.7%	46.9%	25.0%	38.6%	19.0%	8.7%	33.3%	52.6%	31.6%	29.0%	34.2%
	オミクロン株	7.1%	14.7%	18.2%	21.7%	30.0%	17.5%	7.7%	14.3%	32.4%	12.5%	11.1%	19.1%	18.3%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	-	-	-	-	-	-	6.7%	-	14.3%	-	3.4%	2.1%
	2回目	6.9%	-	-	-	-	1.6%	-	7.1%	3.4%	8.0%	9.1%	4.6%	3.2%
	3回目	5.0%	-	5.6%	-	-	2.1%	4.8%	4.3%	-	5.3%	-	2.4%	2.2%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9%	-	-	1.1%	0.5%



②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目	-	-	-	11.1%	50.0%	5.3%	-	6.7%	11.8%	-	-	5.2%	5.2%
	2回目	-	2.4%	-	-	-	0.8%	10.3%	-	3.4%	12.0%	-	5.3%	3.2%
	3回目	5.0%	-	-	-	-	0.7%	-	4.3%	-	-	5.3%	1.6%	1.1%
	オミクロン株	-	5.9%	-	-	-	1.9%	-	-	2.9%	-	-	1.1%	1.5%
接種日の翌日	1回目	88.9%	100%	100%	77.8%	50.0%	89.5%	93.8%	73.3%	82.4%	71.4%	100%	82.8%	85.4%
	2回目	93.1%	95.1%	89.7%	100%	66.7%	93.8%	75.9%	82.1%	79.7%	68.0%	90.9%	78.3%	85.4%
	3回目	95%	92.5%	66.7%	84.4%	100%	84.8%	90.5%	73.9%	78.6%	89.5%	84.2%	82.3%	83.6%
	オミクロン株	100%	94.1%	100%	95.7%	90.0%	96.1%	100%	85.7%	88.2%	95.8%	88.9%	91.5%	93.9%
接種日の翌々日	1回目	11.1%	-	-	11.1%	-	5.3%	6.3%	20.0%	5.9%	28.6%	-	12.1%	9.4%
	2回目	6.9%	2.4%	10.3%	-	33.3%	5.5%	13.8%	17.9%	16.9%	20.0%	9.1%	16.4%	11.4%
	3回目	-	7.5%	33.3%	15.6%	-	14.5%	4.8%	21.7%	21.4%	10.5%	10.5%	15.3%	14.9%
	オミクロン株	-	-	-	4.3%	10.0%	1.9%	-	14.3%	8.8%	4.2%	11.1%	7.4%	4.6%
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目	-	-	-	-	-	-	4.8%	-	-	-	-	0.8%	0.4%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目	3.4%	2.4%	-	-	-	1.6%	3.4%	3.6%	5.1%	-	-	3.3%	2.5%
	3回目	-	3.8%	-	3.1%	-	2.1%	-	4.3%	-	-	-	0.8%	1.5%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2%	-	1.1%	0.5%
受診しなかった	1回目	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2回目	96.6%	97.6%	100%	100%	100%	98.4%	96.6%	96.4%	94.9%	100%	100%	96.7%	97.5%
	3回目	100%	96.2%	100%	96.9%	100%	97.9%	100%	95.7%	100%	100%	100%	99.2%	98.5%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.8%	100%	98.9%	99.5%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	100%	100%	100%	77.8%	50.0%	92.1%	81.3%	86.7%	88.2%	71.4%	66.7%	82.8%	86.5%
	2回目	41.4%	53.7%	65.5%	57.7%	66.7%	54.7%	44.8%	57.1%	49.2%	68.0%	54.5%	53.3%	53.9%
	3回目	40.0%	35.8%	50.0%	50.0%	50.0%	43.4%	47.6%	43.5%	50.0%	36.8%	63.2%	48.4%	45.7%
	オミクロン株	28.6%	52.9%	77.3%	65.2%	60.0%	58.3%	46.2%	64.3%	55.9%	54.2%	88.9%	58.5%	58.4%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	-	-	-	22.2%	50.0%	7.9%	18.8%	13.3%	11.8%	28.6%	33.3%	17.2%	13.5%
	2回目	58.6%	46.3%	34.5%	42.3%	33.3%	45.3%	55.2%	42.9%	50.8%	32.0%	45.5%	46.7%	46.1%
	3回目	60.0%	64.2%	50.0%	50.0%	50.0%	56.6%	52.4%	56.5%	50.0%	63.2%	36.8%	51.6%	54.3%
	オミクロン株	71.4%	47.1%	22.7%	34.8%	40.0%	41.7%	53.8%	35.7%	44.1%	45.8%	11.1%	41.5%	41.6%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
前回よりも症状が重かったと思う	(14名)	(33名)	(20名)	(20名)	(9名)	(96名)	(12名)	(12名)	(34名)	(20名)	(7名)	(85名)	(181名)
前回よりも症状が軽かったと思う	42.9%	21.2%	10.0%	10.0%	11.1%	18.8%	8.3%	-	2.9%	15.0%	14.3%	7.1%	13.3%
前回と同じ程度だったと思う	21.4%	57.6%	60.0%	50.0%	44.4%	50.0%	66.7%	83.3%	44.1%	40.0%	42.9%	51.8%	50.8%
前回と同じ程度だったと思う	35.7%	21.2%	30.0%	40.0%	44.4%	31.3%	25.0%	16.7%	52.9%	45.0%	42.9%	41.2%	35.9%





◎関節や筋肉の痛み(接種部位は除く)の症状に対するアンケート結果



①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(6名)	(7名)	(4名)	(4名)	(1名)	(22名)	(7名)	(9名)	(7名)	(7名)	(4名)	(34名)	(56名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(21名)	(23名)	(12名)	(15名)	(3名)	(74名)	(22名)	(18名)	(28名)	(14名)	(5名)	(87名)	(161名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(14名)	(30名)	(31名)	(20名)	(3名)	(98名)	(21名)	(19名)	(28名)	(16名)	(13名)	(97名)	(195名)	
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(10名)	(13名)	(8名)	(12名)	(3名)	(46名)	(9名)	(8名)	(16名)	(10名)	(3名)	(46名)	(92名)	
接種日のみ	1回目	-	-	-	-	-	14.3%	-	-	-	-	2.9%	1.8%	
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接種日から翌日まで	1回目	66.7%	28.6%	25.0%	50.0%	-	40.9%	14.3%	44.4%	-	28.6%	50.0%	26.5%	32.1%
	2回目	42.9%	21.7%	25.0%	26.7%	-	28.4%	40.9%	27.8%	10.7%	21.4%	-	23.0%	25.5%
	3回目	14.3%	23.3%	16.1%	15.0%	-	17.3%	19.0%	21.1%	21.4%	12.5%	7.7%	17.5%	17.4%
	オミクロン株	40.0%	38.5%	25.0%	16.7%	-	28.3%	44.4%	50.0%	37.5%	30.0%	-	37.0%	32.6%
接種日から翌々日まで	1回目	16.7%	28.6%	25.0%	-	-	18.2%	57.1%	33.3%	57.1%	28.6%	25.0%	41.2%	32.1%
	2回目	14.3%	21.7%	25.0%	6.7%	33.3%	17.6%	18.2%	44.4%	17.9%	21.4%	80.0%	27.6%	23.0%
	3回目	28.6%	23.3%	16.1%	25.0%	33.3%	22.4%	28.6%	26.3%	28.6%	43.8%	46.2%	33.0%	27.7%
	オミクロン株	40.0%	30.8%	25.0%	33.3%	33.3%	32.6%	33.3%	37.5%	25.0%	60.0%	66.7%	39.1%	35.9%
接種日の翌日のみ	1回目	-	14.3%	-	-	-	4.5%	-	-	28.6%	-	-	5.9%	5.4%
	2回目	28.6%	43.5%	33.3%	20.0%	33.3%	32.4%	27.3%	5.6%	39.3%	28.6%	20.0%	26.4%	29.2%
	3回目	7.1%	20.0%	16.1%	15.0%	-	15.3%	28.6%	10.5%	7.1%	12.5%	-	12.4%	13.8%
	オミクロン株	10.0%	23.1%	25.0%	16.7%	33.3%	19.6%	11.1%	12.5%	12.5%	10.0%	33.3%	13.0%	16.3%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	16.7%	28.6%	50.0%	25.0%	100%	31.8%	14.3%	11.1%	14.3%	28.6%	-	14.7%	21.4%
	2回目	14.3%	13.0%	16.7%	40.0%	33.3%	20.3%	13.6%	11.1%	32.1%	28.6%	-	20.7%	20.5%
	3回目	50.0%	33.3%	48.4%	45.0%	66.7%	43.9%	23.8%	36.8%	35.7%	31.3%	38.5%	33.0%	38.5%
	オミクロン株	10.0%	7.7%	25.0%	25.0%	33.3%	17.4%	11.1%	-	18.8%	-	-	8.7%	13.0%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	-	-	25.0%	-	4.5%	-	11.1%	-	14.3%	25.0%	8.8%	7.1%
	2回目	-	-	-	6.7%	-	1.4%	-	11.1%	-	-	-	2.3%	1.9%
	3回目	-	-	3.2%	-	-	1.0%	-	5.3%	7.1%	-	7.7%	4.1%	2.6%
	オミクロン株	-	-	-	8.3%	-	2.2%	-	-	6.3%	-	-	2.2%	2.2%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目	16.7%	-	-	-	-	4.5%	42.9%	11.1%	-	14.3%	-	14.7%	10.7%
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目	-	3.3%	-	5.0%	-	2.0%	-	5.3%	-	6.3%	-	2.1%	2.1%
	オミクロン株	-	7.7%	-	-	-	2.2%	-	12.5%	-	-	-	2.2%	2.2%
接種日の翌日	1回目	83.3%	100%	100%	50.0%	100%	86.4%	42.9%	55.6%	71.4%	57.1%	75.0%	58.8%	69.6%
	2回目	90.5%	95.7%	91.7%	93.3%	100%	93.2%	90.9%	77.8%	96.4%	71.4%	80.0%	86.2%	89.4%
	3回目	92.9%	80.0%	64.5%	80.0%	66.7%	76.5%	90.5%	68.4%	71.4%	75.0%	76.9%	76.3%	76.4%
	オミクロン株	90.0%	92.3%	100%	100%	66.7%	93.5%	100%	87.5%	93.8%	100%	100%	95.7%	94.6%
接種日の翌々日	1回目	-	-	-	25.0%	-	4.5%	14.3%	33.3%	28.6%	14.3%	25.0%	23.5%	16.1%
	2回目	9.5%	4.3%	8.3%	-	-	5.4%	9.1%	16.7%	3.6%	28.6%	20.0%	12.6%	9.3%
	3回目	7.1%	16.7%	35.5%	15.0%	33.3%	21.4%	4.8%	26.3%	28.6%	18.8%	23.1%	20.6%	21.0%
	オミクロン株	10.0%	-	-	-	33.3%	4.3%	-	-	6.3%	-	-	2.2%	3.3%
その他	1回目	-	-	-	25.0%	-	4.5%	-	-	-	14.3%	-	2.9%	3.6%
	2回目	-	-	-	6.7%	-	1.4%	-	5.6%	-	-	-	1.1%	1.2%
	3回目	-	-	-	-	-	-	4.8%	-	-	-	-	1.0%	0.5%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目	-	4.3%	-	-	-	1.4%	-	-	7.1%	-	-	2.3%	1.9%
	3回目	-	3.3%	-	-	-	1.0%	-	5.3%	-	-	-	1.0%	1.0%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2回目	100%	95.7%	100%	100%	100%	98.6%	100%	100%	92.9%	100%	100%	97.7%	98.1%
	3回目	100%	96.7%	100%	100%	100%	99.0%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.0%	99.0%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	100%	100%	100%	75.0%	100%	95.5%	100%	77.8%	100%	100%	75.0%	91.2%	92.9%
	2回目	42.9%	60.9%	58.3%	53.3%	66.7%	54.1%	45.5%	72.2%	39.3%	78.6%	60.0%	55.2%	54.7%
	3回目	50.0%	43.3%	51.6%	40.0%	33.3%	45.9%	61.9%	42.1%	39.3%	37.5%	61.5%	47.4%	46.7%
	オミクロン株	40.0%	46.2%	62.5%	66.7%	66.7%	54.3%	33.3%	87.5%	56.3%	40.0%	66.7%	54.3%	54.3%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	-	-	-	25.0%	-	4.5%	-	22.2%	-	-	25.0%	8.8%	7.1%
	2回目	57.1%	39.1%	41.7%	46.7%	33.3%	45.9%	54.5%	27.8%	60.7%	21.4%	40.0%	44.8%	45.3%
	3回目	50.0%	56.7%	48.4%	60.0%	66.7%	54.1%	38.1%	57.9%	60.7%	62.5%	38.5%	52.6%	53.3%
	オミクロン株	60.0%	53.8%	37.5%	33.3%	33.3%	45.7%	66.7%	12.5%	43.8%	60.0%	33.3%	45.7%	45.7%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
	(8名)	(13名)	(7名)	(10名)	(3名)	(41名)	(8名)	(6名)	(12名)	(9名)	(2名)	(37名)	(78名)
前回よりも症状が重かったと思う	50.0%	30.8%	-	10.0%	-	22.0%	12.5%	16.7%	-	33.3%	-	13.5%	17.9%
前回よりも症状が軽かったと思う	25.0%	53.8%	42.9%	20.0%	66.7%	39.0%	25.0%	66.7%	25.0%	22.2%	50.0%	32.4%	35.9%
前回と同じ程度だったと思う	25.0%	15.4%	57.1%	70.0%	33.3%	39.0%	62.5%	16.7%	75.0%	44.4%	50.0%	54.1%	46.2%



◎めまいの症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(1名)	(4名)	(2名)	(0名)	(0名)	(7名)	(8名)
2回目接種後の年代別回答者数	(5名)	(3名)	(3名)	(2名)	(0名)	(13名)	(7名)	(4名)	(7名)	(0名)	(2名)	(20名)	(33名)
3回目接種後の年代別回答者数	(4名)	(6名)	(4名)	(4名)	(2名)	(20名)	(2名)	(5名)	(8名)	(4名)	(0名)	(19名)	(39名)
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(4名)	(2名)	(1名)	(1名)	(0名)	(8名)	(0名)	(0名)	(2名)	(0名)	(0名)	(2名)	(10名)
接種日のみ	1回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%
	2回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	50.0%	10.0%	6.1%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	-	5.3%	2.6%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接種日から翌日まで	1回目	-	-	-	-	-	100%	25.0%	100%	-	-	57.1%	50.0%
	2回目	20.0%	-	-	-	-	7.7%	42.9%	25.0%	14.3%	-	25.0%	18.2%
	3回目	25.0%	16.7%	25.0%	-	-	15.0%	50.0%	-	-	25.0%	10.5%	12.8%
	オミクロン株	50.0%	50.0%	100%	-	-	50.0%	-	-	-	-	-	40.0%
接種日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%
	2回目	-	66.7%	66.7%	-	-	30.8%	-	-	28.6%	-	50.0%	21.2%
	3回目	-	33.3%	25.0%	25.0%	-	20.0%	-	40.0%	12.5%	25.0%	-	20.5%
	オミクロン株	25.0%	-	-	-	-	12.5%	-	-	-	-	-	10.0%
接種日の翌日のみ	1回目	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	12.5%
	2回目	80.0%	33.3%	33.3%	-	-	46.2%	28.6%	-	57.1%	-	30.0%	36.4%
	3回目	25.0%	33.3%	25.0%	-	-	20.0%	-	40.0%	12.5%	25.0%	-	20.5%
	オミクロン株	25.0%	-	-	100%	-	25.0%	-	-	50.0%	-	-	30.0%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回目	-	-	-	50.0%	-	7.7%	28.6%	25.0%	-	-	15.0%	12.1%
	3回目	25.0%	16.7%	25.0%	75.0%	100%	40.0%	50.0%	20.0%	62.5%	25.0%	-	41.0%
	オミクロン株	-	50.0%	-	-	-	12.5%	-	-	-	-	-	10.0%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%
	2回目	-	-	-	50.0%	-	7.7%	-	25.0%	-	-	5.0%	6.1%
	3回目	25.0%	-	-	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	2.6%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	10.0%



②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
接種当日	1回目	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	-	-	28.6%	25.0%
	2回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	14.3%	-	100%	20.0%	12.1%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	5.3%	2.6%
	オミクロン株	-	50.0%	-	-	-	12.5%	-	-	-	-	-	10.0%
接種日の翌日	1回目	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	100%	-	42.9%	50.0%
	2回目	100%	66.7%	33.3%	50.0%	-	69.2%	85.7%	25.0%	71.4%	-	60.0%	63.6%
	3回目	100%	100%	75.0%	50.0%	50%	80.0%	100%	60.0%	50.0%	100%	-	74.4%
	オミクロン株	100%	50.0%	100%	100%	-	87.5%	-	-	100%	-	-	90.0%
接種日の翌々日	1回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%
	2回目	-	33.3%	66.7%	50.0%	-	30.8%	14.3%	25.0%	14.3%	-	15.0%	21.2%
	3回目	-	-	25.0%	50.0%	50.0%	20.0%	-	40.0%	37.5%	-	26.3%	23.1%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%
	2回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	5.0%	3.0%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	-	14.3%	12.5%
	2回目	-	33.3%	-	-	-	7.7%	-	-	14.3%	-	5.0%	6.1%
	3回目	-	-	-	-	50.0%	5.0%	-	-	-	-	-	2.6%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目	-	100%	-	-	-	100%	100%	75.0%	100%	-	85.7%	87.5%
	2回目	100%	66.7%	100%	100%	-	92.3%	100%	100%	85.7%	-	95.0%	93.9%
	3回目	100%	100%	100%	100%	50%	95%	100%	100%	100%	100%	-	97.4%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	100.0%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	-	100%	-	-	-	100%	-	50.0%	50.0%	-	42.9%	50.0%
	2回目	40.0%	33.3%	66.7%	100%	-	53.8%	42.9%	100%	42.9%	-	60.0%	57.6%
	3回目	25.0%	33.3%	50.0%	-	-	25.0%	50.0%	20.0%	25.0%	50.0%	-	28.2%
	オミクロン株	25.0%	50.0%	100%	-	-	37.5%	-	-	50.0%	-	-	40.0%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	-	-	-	-	-	-	100%	50.0%	50.0%	-	57.1%	50.0%
	2回目	60.0%	66.7%	33.3%	-	-	46.2%	57.1%	-	57.1%	-	40.0%	42.4%
	3回目	75.0%	66.7%	50.0%	100%	100%	75.0%	50.0%	80.0%	75.0%	50.0%	-	71.8%
	オミクロン株	75.0%	50.0%	-	100%	-	62.5%	-	-	50.0%	-	-	60.0%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	~20代	30代	40代	50代	60代~	計	
前回よりも症状が重かったと思う	-	50.0%	-	-	-	16.7%	-	-	-	-	-	-	12.5%
前回よりも症状が軽かったと思う	-	50.0%	100%	100%	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	37.5%
前回と同じ程度だったと思う	100%	-	-	-	-	33.3%	-	-	100%	-	-	100%	50.0%

(7) 頭痛の発症割合グラフ(下表①と⑤の男女計)



◎頭痛の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
1回目接種後の年代別回答者数	(2名)	(3名)	(3名)	(2名)	(2名)	(12名)	(8名)	(13名)	(8名)	(8名)	(4名)	(41名)	(53名)	
2回目接種後の年代別回答者数	(20名)	(21名)	(17名)	(8名)	(1名)	(67名)	(19名)	(19名)	(43名)	(15名)	(7名)	(103名)	(170名)	
3回目接種後の年代別回答者数	(16名)	(36名)	(21名)	(16名)	(1名)	(90名)	(19名)	(23名)	(36名)	(20名)	(13名)	(111名)	(201名)	
オミكرون株接種後の年代別回答者数	(10名)	(15名)	(10名)	(7名)	(4名)	(46名)	(9名)	(12名)	(21名)	(10名)	(7名)	(59名)	(105名)	
接種日のみ	1回目	50.0%	-	33.3%	-	-	16.7%	-	15.4%	12.5%	-	-	7.3%	9.4%
	2回目	-	4.8%	-	-	100%	3.0%	-	-	2.3%	6.7%	-	1.9%	2.4%
	3回目	-	2.8%	9.5%	-	-	3.3%	10.5%	8.7%	-	5.0%	-	4.5%	4.0%
	オミكرون株	-	-	-	-	-	-	11.1%	8.3%	-	-	-	3.4%	1.9%
接種日から翌日まで	1回目	-	-	-	50.0%	-	8.3%	50.0%	23.1%	37.5%	37.5%	25.0%	34.1%	28.3%
	2回目	30.0%	19.0%	29.4%	12.5%	-	23.9%	52.6%	15.8%	25.6%	-	28.6%	25.2%	24.7%
	3回目	12.5%	5.6%	19.0%	6.3%	-	10.0%	21.1%	8.7%	27.8%	45.0%	15.4%	24.3%	17.9%
	オミكرون株	40.0%	20.0%	50.0%	14.3%	75.0%	34.8%	33.3%	16.7%	42.9%	40.0%	57.1%	37.3%	36.2%
接種日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	50.0%	8.3%	50.0%	23.1%	25.0%	12.5%	50.0%	29.3%	24.5%
	2回目	15.0%	14.3%	23.5%	25.0%	-	17.9%	5.3%	47.4%	18.6%	33.3%	28.6%	24.3%	21.8%
	3回目	25.0%	19.4%	14.3%	25.0%	100.0%	21.1%	10.5%	30.4%	27.8%	15.0%	53.8%	26.1%	23.9%
	オミكرون株	30.0%	33.3%	-	14.3%	-	19.6%	33.3%	33.3%	9.5%	40.0%	28.6%	25.4%	22.9%
接種日の翌日のみ	1回目	50.0%	100%	33.3%	-	50.0%	50.0%	-	15.4%	-	12.5%	-	7.3%	17.0%
	2回目	20.0%	38.1%	35.3%	37.5%	-	31.3%	21.1%	10.5%	34.9%	13.3%	28.6%	24.3%	27.1%
	3回目	6.3%	33.3%	14.3%	6.3%	-	18.9%	26.3%	8.7%	13.9%	20.0%	-	14.4%	16.4%
	オミكرون株	20.0%	26.7%	40.0%	57.1%	25.0%	32.6%	11.1%	25.0%	14.3%	10.0%	14.3%	15.3%	22.9%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	-	-	33.3%	50.0%	-	16.7%	-	15.4%	12.5%	25.0%	25.0%	14.6%	15.1%
	2回目	30.0%	19.0%	11.8%	12.5%	-	19.4%	10.5%	21.1%	11.6%	46.7%	14.3%	18.4%	18.8%
	3回目	50.0%	33.3%	38.1%	50.0%	-	40.0%	31.6%	30.4%	27.8%	10.0%	30.8%	26.1%	32.3%
	オミكرون株	10.0%	20.0%	10.0%	14.3%	-	13.0%	11.1%	16.7%	28.6%	10.0%	-	16.9%	15.2%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	-	-	-	-	-	-	7.7%	12.5%	12.5%	-	7.3%	5.7%
	2回目	5.0%	4.8%	-	12.5%	-	4.5%	10.5%	5.3%	7.0%	-	-	5.8%	5.3%
	3回目	6.3%	5.6%	4.8%	12.5%	-	6.7%	-	13.0%	2.8%	5.0%	-	4.5%	5.5%
	オミكرون株	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8%	-	-	1.7%	1.0%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目	50.0%	-	33.3%	50.0%	-	25.0%	25.0%	15.4%	25.0%	25.0%	-	19.5%	20.8%
	2回目	5.0%	9.5%	-	-	100%	6.0%	5.3%	5.3%	7.0%	6.7%	-	5.8%	5.9%
	3回目	-	-	4.8%	6.3%	-	2.2%	10.5%	8.7%	2.8%	5.0%	7.7%	6.3%	4.5%
	オミكرون株	-	6.7%	-	-	-	2.2%	11.1%	16.7%	9.5%	-	14.3%	10.2%	6.7%
接種日の翌日	1回目	50.0%	100%	33.3%	50.0%	100%	66.7%	62.5%	69.2%	62.5%	37.5%	75.0%	61.0%	62.3%
	2回目	90.0%	76.2%	82.4%	87.5%	-	82.1%	73.7%	84.2%	79.1%	73.3%	71.4%	77.7%	79.4%
	3回目	81.3%	86.1%	61.9%	68.8%	100.0%	76.7%	78.9%	73.9%	86.1%	80.0%	76.9%	80.2%	78.6%
	オミكرون株	100%	80.0%	100%	100%	100%	93.5%	88.9%	83.3%	90.5%	100%	85.7%	89.8%	91.4%
接種日の翌々日	1回目	-	-	33.3%	-	-	8.3%	12.5%	7.7%	12.5%	37.5%	25.0%	17.1%	15.1%
	2回目	5.0%	14.3%	17.6%	12.5%	-	11.9%	21.1%	10.5%	9.3%	20.0%	28.6%	14.6%	13.5%
	3回目	18.8%	11.1%	33.3%	25.0%	-	20.0%	10.5%	17.4%	8.3%	10.0%	15.4%	11.7%	15.4%
	オミكرون株	-	13.3%	-	-	-	4.3%	-	-	-	-	-	-	1.9%
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	-	7.7%	-	-	-	2.4%	1.9%
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7%	-	-	1.9%	1.2%
	3回目	-	2.8%	-	-	-	1.1%	-	-	2.8%	5.0%	-	1.8%	1.5%
	オミكرون株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	-	-	2.4%	1.9%
	2回目	5.0%	4.8%	-	-	-	3.0%	-	-	4.7%	-	-	1.9%	2.4%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	4.3%	-	5.0%	-	1.8%	1.0%
	オミكرون株	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8%	-	14.3%	3.4%	1.9%
受診しなかった	1回目	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87.5%	100%	100%	97.6%	98.1%
	2回目	95.0%	95.2%	100%	100%	100%	97.0%	100%	100%	95.3%	100%	100%	98.1%	97.6%
	3回目	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	95.7%	100%	95.0%	100%	98.2%	99.0%
	オミكرون株	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.2%	100.0%	85.7%	96.6%	98.1%

④症状が出ていた時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	100%	66.7%	100%	100%	50.0%	83.3%	87.5%	69.2%	75.0%	75.0%	75.0%	75.6%	77.4%
	2回目	45.0%	52.4%	52.9%	62.5%	100%	52.2%	52.6%	63.2%	46.5%	60.0%	57.1%	53.4%	52.9%
	3回目	37.5%	22.2%	47.6%	43.8%	100.0%	35.6%	47.4%	30.4%	47.2%	55.0%	76.9%	48.6%	42.8%
	オミكرون株	30.0%	33.3%	60.0%	42.9%	50.0%	41.3%	55.6%	66.7%	52.4%	50.0%	100%	61.0%	52.4%
この副反応の症状が重く、生活(仕事)に支障をきたす状態であったため自宅で安静にしていた	1回目	-	33.3%	-	-	50.0%	16.7%	12.5%	30.8%	25.0%	25.0%	25.0%	24.4%	22.6%
	2回目	55.0%	47.6%	47.1%	37.5%	-	47.8%	47.4%	36.8%	53.5%	40.0%	42.9%	46.6%	47.1%
	3回目	62.5%	77.8%	52.4%	56.3%	-	64.4%	52.6%	69.6%	52.8%	45.0%	23.1%	51.4%	57.2%
	オミكرون株	70.0%	66.7%	40.0%	57.1%	50.0%	58.7%	44.4%	33.3%	47.6%	50.0%	-	39.0%	47.6%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
	(8名)	(11名)	(8名)	(4名)	(0名)	(31名)	(7名)	(9名)	(19名)	(9名)	(6名)	(50名)	(81名)
前回よりも症状が重かったと思う	37.5%	36.4%	12.5%	25.0%	-	29.0%	-	11.1%	10.5%	44.4%	33.3%	18.0%	22.2%
前回よりも症状が軽かったと思う	37.5%	18.2%	62.5%	25.0%	-	35.5%	42.9%	66.7%	31.6%	33.3%	50.0%	42.0%	39.5%
前回と同じ程度だったと思う	25.0%	45.5%	25.0%	50.0%	-	35.5%	57.1%	22.2%	57.9%	22.2%	16.7%	40.0%	38.3%



## (8) その他(吐き気、リンパの腫れ・痛み、下痢など)の症状に対するアンケート結果

①いつから、いつまで続いたか。	男性(副反応があった人数)						女性(副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
1回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(0名)	(0名)	(0名)	(0名)	(1名)	(2名)	(3名)	(8名)	(2名)	(0名)	(15名)	(16名)
2回目接種後の年代別回答者数	(1名)	(3名)	(2名)	(1名)	(0名)	(7名)	(6名)	(6名)	(11名)	(5名)	(2名)	(30名)	(37名)
3回目接種後の年代別回答者数	(5名)	(3名)	(3名)	(5名)	(0名)	(16名)	(7名)	(15名)	(14名)	(14名)	(2名)	(52名)	(68名)
オミクロン株接種後の年代別回答者数	(1名)	(2名)	(1名)	(1名)	(0名)	(5名)	(2名)	(1名)	(5名)	(3名)	(2名)	(13名)	(18名)
接種日のみ	1回目	100%	-	-	-	100%	50.0%	33.3%	25.0%	-	-	26.7%	31.3%
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	7.1%	7.1%	-	3.8%	2.9%
	オミクロン株	-	50.0%	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	5.6%
接種日から翌日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	50.0%	-	13.3%	12.5%
	2回目	-	-	50.0%	-	-	14.3%	50.0%	16.7%	18.2%	20.0%	23.3%	21.6%
	3回目	-	-	-	-	-	-	14.3%	6.7%	14.3%	14.3%	11.5%	8.8%
	オミクロン株	100%	-	-	-	-	20.0%	50.0%	-	20.0%	-	15.4%	16.7%
接種日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	50.0%	-	25.0%	50.0%	-	26.7%	25.0%
	2回目	-	33.3%	-	-	-	-	-	27.3%	20.0%	50.0%	16.7%	16.2%
	3回目	40.0%	33.3%	-	20.0%	-	25.0%	14.3%	33.3%	42.9%	28.6%	30.8%	29.4%
	オミクロン株	-	50.0%	-	-	-	20.0%	-	-	20.0%	66.7%	50.0%	27.8%
接種日の翌日のみ	1回目	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	-	-	13.3%	12.5%
	2回目	-	66.7%	50.0%	-	-	42.9%	-	36.4%	40.0%	50.0%	23.3%	27.0%
	3回目	40.0%	33.3%	33.3%	40.0%	-	37.5%	-	13.3%	7.1%	7.1%	7.7%	14.7%
	オミクロン株	-	-	100%	100%	-	40.0%	-	-	20.0%	33.3%	-	15.4%
接種日の翌日から翌々日まで	1回目	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	-	6.7%	6.3%
	2回目	-	-	-	100%	-	14.3%	50.0%	50.0%	-	-	20.0%	18.9%
	3回目	-	33.3%	-	20.0%	-	12.5%	42.9%	20.0%	14.3%	7.1%	100%	19.1%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	50.0%	100%	-	-	-	15.4%
その他(数日間続いた等)	1回目	-	-	-	-	-	-	33.3%	12.5%	-	-	13.3%	12.5%
	2回目	100%	-	-	-	-	14.3%	-	33.3%	18.2%	20.0%	16.7%	16.2%
	3回目	20.0%	-	66.7%	20.0%	-	25.0%	28.6%	26.7%	14.3%	35.7%	25.0%	25.0%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	50.0%	23.1%

②ピークはいつだったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
接種当日	1回目	100%	-	-	-	-	100%	50.0%	33.3%	25.0%	-	-	26.7%	31.3%
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	16.7%	9.1%	20.0%	-	10.0%	8.1%
	3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1%	14.3%	-	5.8%	4.4%
	オミクロン株	-	50.0%	-	-	-	20.0%	-	-	-	-	-	-	5.6%
接種日の翌日	1回目	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	62.5%	100%	-	53.3%	50.0%
	2回目	100%	100%	100%	100%	-	100%	83.3%	33.3%	54.5%	80.0%	50.0%	60.0%	67.6%
	3回目	100%	67%	33.3%	100%	-	81.3%	71.4%	60.0%	64.3%	42.9%	100%	59.6%	64.7%
	オミクロン株	100%	50.0%	100%	100%	-	80.0%	100%	100%	40.0%	100%	100%	76.9%	77.8%
接種日の翌々日	1回目	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	12.5%	-	-	13.3%	12.5%
	2回目	-	-	-	-	-	-	16.7%	16.7%	18.2%	-	50.0%	16.7%	13.5%
	3回目	-	33.3%	66.7%	-	-	18.8%	14.3%	26.7%	28.6%	35.7%	-	26.9%	25.0%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0%	-	-	15.4%	11.1%
その他	1回目	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	-	-	-	6.7%	6.3%
	2回目	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	18.2%	-	-	13.3%	10.8%
	3回目	-	-	-	-	-	-	14.3%	13.3%	-	7.1%	-	7.7%	5.9%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0%	-	-	7.7%	5.6%

③病院を受診したか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
受診した	1回目	-	-	-	-	-	-	-	33.3%	12.5%	-	-	13.3%	12.5%
	2回目	-	33.3%	-	-	-	14.3%	-	16.7%	18.2%	-	-	10.0%	10.8%
	3回目	-	-	33.3%	-	-	6.3%	-	6.7%	-	7.1%	-	3.8%	4.4%
	オミクロン株	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受診しなかった	1回目	100%	-	-	-	-	100%	100%	66.7%	87.5%	100%	-	86.7%	87.5%
	2回目	100%	66.7%	100%	100%	-	85.7%	100%	83.3%	81.8%	100%	100%	90.0%	89.2%
	3回目	100%	100%	66.7%	100%	-	93.8%	100%	93.3%	100%	92.9%	100%	96.2%	95.6%
	オミクロン株	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%

④症状が出ている時、どういう状態だったか。	男性						女性						男女計	
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計		
我慢しながらではあったが、普段通りの生活(仕事)をしていた	1回目	100%	-	-	-	-	100%	50.0%	66.7%	75.0%	50.0%	-	66.7%	68.8%
	2回目	100%	-	50.0%	100%	-	42.9%	33.3%	50.0%	54.5%	40.0%	50.0%	46.7%	45.9%
	3回目	20.0%	100%	66.7%	40.0%	-	50.0%	28.6%	40.0%	42.9%	71.4%	50.0%	48.1%	48.5%
	オミクロン株	-	50.0%	100%	100%	-	60.0%	50.0%	100%	60.0%	33.3%	100%	61.5%	61.1%
症状がひどく生活(仕事)に支障がある状態で、自宅で安静にしていた	1回目	-	-	-	-	-	-	50.0%	33.3%	25.0%	50.0%	-	33.3%	31.3%
	2回目	-	100%	50.0%	-	-	57.1%	66.7%	50.0%	45.5%	60.0%	50.0%	53.3%	54.1%
	3回目	80.0%	-	33.3%	60.0%	-	50.0%	71.4%	60.0%	57.1%	28.6%	50.0%	51.9%	51.5%
	オミクロン株	100%	50.0%	-	-	-	40.0%	50.0%	-	40.0%	66.7%	-	38.5%	38.9%

⑤前回接種後と同じ副反応があった場合、その時の症状と比べて、度合いはどうでしたか。	男性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						女性(3回目接種後と同じ副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
	(0名)	(0名)	(1名)	(0名)	(0名)	(1名)	(2名)	(0名)	(3名)	(1名)	(1名)	(7名)	(8名)
前回よりも症状が重かったと思う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.3%	12.5%
前回よりも症状が軽かったと思う	-	-	-	-	-	-	50.0%	-	33.3%	-	-	28.6%	25.0%
前回と同じ程度だったと思う	-	-	100.0%	-	-	100%	50.0%	-	66.7%	100.0%	-	57.1%	62.5%

【参考】その他の副反応症状のうち回答が多かった上位3つの副反応発症人数	男性(オミクロン株接種後にその他の副反応があった人数)						女性(オミクロン株接種後にその他の副反応があった人数)						男女計
	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	～20代	30代	40代	50代	60代～	計	
	(1名)	(2名)	(1名)	(1名)	(0名)	(5名)	(2名)	(1名)	(5名)	(3名)	(2名)	(13名)	(18名)
①「嘔吐・吐き気」があったと回答した方	100%	50%	-	-	-	40%	100%	-	40%	67%	-	46%	44%
	1	1	-	-	-	2	2	-	2	2	-	6	8
②「リンパの腫れ・痛み」があったと回答した方	-	-	-	-	-	0%	-	100%	40%	-	-	23%	17%
	-	-	-	-	-	0	-	1	2	-	-	3	3
③「下痢」があったと回答した方	-	-	-	100%	-	20%	-	-	20%	33%	-	15%	17%
	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	3

※その他の副反応があったと回答した方は18名いますが、一人で複数のその他の副反応が発症した方もいるため年代別の回答者数とは一致しません。